

*Circus cyaneus* (Linnaeus, 1758)

Castellano: Aguilucho pálido

Catalán: Esparver d'estany

Gallego: Gatafornela

Vasco: Mirotz zuria

## **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

## **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: La población reproductora española ocupa básicamente el tercio norte septentrional (1). Se ha citado como reproductor de manera dispersa en otras áreas más meridionales: Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura (2, 3). Durante el invierno ocupa prácticamente toda la Península.

CE: Cría en Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania; de forma esporádica también en Dinamarca (4).

MUNDO: Nidifica en gran parte del Holártico y en la mitad meridional de Sudamérica. Como invernante, en el sur de Europa, centro de Asia, Norteamérica y Centroamérica (5).

## **HABITAT**

El hábitat típico de nidificación está formado por matorrales bajos y densos de brezos, tojos, etc., por debajo de 1.800 m. Igualmente frecuente pastizales, tierras de labor, pudiéndosele observar en repoblaciones muy jóvenes de coníferas. En determinados enclaves de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura cría en cultivos de cereal (1,3,5).

## **POBLACION**

ESPAÑA: No existen censos globales sobre el tamaño de la población. En 1977 se aventuró la cifra de 500 parejas para la población española (6). En 1989, extrapolarando densidades obtenidas en zonas concretas, se estimó una población de 300400 parejas (1).

CE: La mayor población es la francesa, con 2.800-3.800 parejas; en Gran Bretaña, 750-800 parejas; en Holanda, 100-300; en Alemania, 11 5-120 (4).

MUNDO: En Suecia, 1.000-2.000 parejas. No hay datos del resto del Paleártico

(4, 5).

## AMENAZAS

La principal amenaza es la destrucción de; hábitat, fundamentalmente los matorrales de montaña. Durante el invierno sufre pérdidas a causa de la caza ilegal y es vulnerable a la quema de la vegetación donde se asientan los dormideros comunales (1).

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación de sus hábitats naturales. Es necesario conocer con más precisión la distribución, situación y problemas de conservación de la especie (1).

## REFERENCIAS

1. De Juana, F. (1989): "Situación actual de las rapaces diurnas (Orden Falconiformes) en España" *Ecología*, 3: 237-293.
2. Fernández, M.; Ortega, A.; Pérez, E.; Hernández, A.; Casado, S., y Vega, C. (1989): "Situación de los aguiluchos en la provincia de Madrid". *Quercus*, 36: 27-33.
3. J. Jiménez: Comunicación personal, mayo de 1992.
4. De Juana, E.; De Juana, F., y Calvo, S. (1988): "La invernada de las aves de presa (O. Falconiformes) en la Península Ibérica". *Monografía SEO*, 1: 97-122.
5. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. II Oxford University Press, Oxford.
6. Garzón, J. (1977): "Birds of Prey in Spain, the present situation". *World Conference on Birds of Prey*. 159-170. Vienna.