

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Castellano: Avetoro

Catalán: Bitó comú

Gallego: Boi

Vasco: Txori zezen arrunta

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: EN PELIGRO

CE: VULNERABLE

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: En 1991 se localizaron machos con territorio en Cataluña (Delta del Ebro y Aiguamolls de l'Empordá), Valencia (Prat de Cabanes-Torreblanca y Marjal del Moro), Baleares (S'Albufera de Mallorca), Andalucía (Marismas del Guadalquivir), Castilla-La Mancha (Parque Nacional de Daimiel y Laguna del Taray) y depresión del Ebro en tres localidades entre Navarra y Aragón (1).

CE: Nidifica de forma dispersa, y a veces con carácter irregular, en todos los países de la Comunidad, excepto Luxemburgo, Irlanda y Portugal (2).

MUNDO: La subespecie nominal cría en el Paleártico desde Europa hasta la antigua Unión Soviética y el norte de Africa. La subespecie *B. s. capensis* se encuentra en el sur de Africa (3).

HABITAT

Se encuentra estrechamente ligado a los humedales de zonas bajas con vegetación palustre muy densa. Evita las áreas con matorral y arbolado, aunque sea disperso.

POBLACION

ESPAÑA: En 1991 se localizaron 29-30 territorios de machos (cada uno de los cuales puede tener una o varias hembras). Los mayores núcleos están en el Delta del Ebro (diez territorios) (4), el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordá (cinco territorios) (5) y las Marismas del Guadalquivir (seis territorios) (1). Se ha detectado también en S'Albufera de Mallorca y el Marjal del Moro (2 territorios) (6, 7) y en el Prat de Cabanes-Torreblanca, Parque Nacional de Daimiel y la Laguna del Taray (un territorio) (1). En las últimas décadas se ha producido una fuerte regresión, pero actualmente la población muestra una ligera recuperación.

CE: Las mayores poblaciones están en Francia (210-325 parejas), Holanda (200700 parejas) y Alemania (1 50-170 parejas). Se encuentra también en Bélgica, Dinamarca, Italia y Gran Bretaña, con 60, 55, 40-50 y 22-25 parejas, respectivamente. Probablemente existen algunas parejas en Grecia (2).

MUNDO: Experimenta fuertes oscilaciones poblacionales y variaciones en su área de distribución. Se estima que después de los inviernos rigurosos las poblaciones del noroeste de Europa se reducen entre el 30 y el 50%. A principios de los ochenta la población europea se estimó en 2.500-2.700 parejas (8).

AMENAZAS

El fuerte descenso de las décadas pasadas se ha debido a la pérdida de hábitat. Muchas antiguas zonas de cría han sido desecadas o han sufrido una importante disminución en la cobertura de la vegetación palustre. Además, en el Parque Nacional de Doñana las molestias ocasionadas por los cangrejeros constituyen una amenaza grave (9). En algunas zonas la caza puede seguir constituyendo una importante causa de mortalidad no natural (10). La persecución directa parece haber tenido una influencia muy inferior (3, 8).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Actualmente casi todas las zonas de cría se encuentran en espacios protegidos. Para favorecer la recuperación de la especie es preciso proteger estrictamente los humedales donde nidifique -evitando la destrucción de las zonas con vegetación más densa- y recuperar hábitats favorables. Revisar planes de aprovechamiento cinegético en las zonas donde exista la especie. Es conveniente limitar las investigaciones que supongan una perturbación en la reproducción. En Doñana es importante resolver el problema de los cangrejeros.

REFERENCIAS

1. Urdiales, C. (en preparación): *El Avetoro en España. Bases documentales para su gestión*. Monografías ICONA.
2. Anónimo (1990): *Fiches d'information sur les espèces énumérées dans l'annexe 1 de la Directive 79/409/CEE*. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Informe Inédito.
3. Cramp, S., y Simons, K.E.L. (1977): *The Birds of the Western Palearctic. Vol. I* Oxford University Press, Oxford.
4. *Archivos del Parque Natural del Delta del Ebro. En (1)*.
5. *Archivos del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordá. En (1)*.
6. *Archivos del Parque Natural de S'Albufera de Mallorca. En (1)*.
7. *Archivos del Parque Natural de la Albufera de Valencia. En (1)*.
8. Day, J. C. V. (1 981): "Status of Bittern in Europe since 1976". *Brit. Birds*, 74: 10-16.
9. Máñez, M. (1 991): Estado actual en el Parque Nacional de Doñana de las especies de aves incluidas en la "Lista Roja de los Vertebrados de España" dentro de las categorías "En Peligro" y "Vulnerable". *Actas de las Jornadas sobre Zonas Húmedas Andaluzas*. Fuentedepiedra, 20-22 de abril de 1990: 41-49 pp.
10. Sargatal, J., y Del Hoyo, J. (1 989): *Els ocells del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordá*. Lynx Ed., Barcelona.