

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Castellano: Lechuza campestre

Catalán: Mussol emigrant

Gallego: Curuxa das xunqueiras

Vasco: Zingira-hontza

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Nidificante esporádico. Entre 1956 y 1991 se conocen cuatro citas de cría: Delta del Ebro, Madrid, Barcelona y Mallorca (1). Relativamente frecuente en migración, aunque las observaciones son más frecuentes entre octubre y diciembre (1). En Baleares es migrante e invernante en cantidad escasa. En Canarias, invernante bastante escaso (2, 3).

CE: Nidifica en alguno de los países, pero en localidades aisladas y poco numerosas, con excepción de Gran Bretaña. En casi todos los países ha criado esporádicamente (2). En gran parte de Europa occidental invernán aves procedentes del norte europeo, sobre todo en las costas y en valles fluviales. No nidifica en Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, ni prácticamente en España.

MUNDO: En Europa nidifica en Islandia, Fennoscandia y países orientales. Además en casi toda la mitad septentrional de Asia, en la mitad septentrional de América del Norte y en el tercio meridional de América del sur y en algunas áreas aisladas del Caribe y noroeste de América del sur, entre otras. La invernada tiene lugar principalmente en las mitades meridionales de América, tanto del norte como del sur, Asia y Europa; en África central inverna en el oeste y en el centro-oeste.

HABITAT

Cría en zonas húmedas con vegetación palustre, en terrenos más bien despejados, sin arbolado. En migración, también terrenos secos, como parameras, dunas costeras, etc.; regadíos; en el sureste, también salinas. La abundancia de micromamíferos parece determinar la selección del hábitat (1).

POBLACION

ESPAÑA: Hay pocos datos sobre el tamaño de población invernal. La mayoría de las observaciones se producen en la mitad septentrional de la Península y Baleares. En 90% de las citas corresponden a individuos solitarios, pero existe una observación de 40 ejemplares. Se producen grandes fluctuaciones interanuales (1).

CE: Como nidificante, las poblaciones censadas o estimadas proporcionan cifras de 1.000-10.000 parejas en Gran Bretaña; en Francia, 10-100 parejas; Holanda, 130-185 parejas; Alemania occidental, de 300-350 parejas en buenos

años deroedores a 30-100 parejas en años malos; Dinamarca, sólo 5-30 parejas. Otros países, esporádico o sin cuantificar. Como invernantes, no evaluados (4).

MUNDO: En el resto de Europa, 150-300 parejas en Islandia; Suecia, 8.000-10.000 parejas; Finlandia, unas 9.000 parejas; Estonia, unas 1.000 parejas. No cría en Groenlandia. Poblaciones de las demás partes del mundo no evaluadas numéricamente de forma concreta.

AMENAZAS

Destrucción y transformación del hábitat principalmente. Caza ilegal en áreas de invernada.

MEDIDAS DE CONSERVACION

En España, protección legal efectiva y también protección de las zonas húmedas de invernada (manejo de carrizales, evitando la transformación del medio).

REFERENCIAS

1. Asensio, B.; Cantos, F.; Fernández, A., y Fajardo, J. (1992): "La Lechuza campestre en España". *Quercus*, 76: 18-24.
2. Mayol, J. (1978): *Els ocells de les Balears*. Moll, Palma de Mallorca.
3. Fernández-Cruz, F., y Araújo, J., eds. (1985): *Situación de la avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia*. CODA- SEO, Madrid.
4. Cramp, S. (1985): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol IV. Oxford University Press, Oxford.