



***Columba bollii*** Godman, 1872

Castellano: Paloma turqué

## CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

ENDEMISMO ESPAÑOL

## DISTRIBUCION

Endémica de las Islas Canarias. Cría en Tenerife, Gomera y La Palma. Ha sido observada en Hierro, donde no se ha comprobado su nidificación. A finales del siglo pasado desapareció de Gran Canaria (1).

## HABITAT

Su hábitat típico es la laurisilva, aunque en ocasiones se puede observar alimentándose en zonas de borde (cultivos, pinar - mixto, etc.) (2).

## POBLACION

La población total de la especie se estimó en 1985 en unas 575-650 parejas, repartidas de la siguiente forma: Tenerife, 175-200; Gomera, 275-300; La Palma, 125-150. En Hierro se ha observado desde 1984 una población de 10-15 aves, cuya cría no ha sido confirmada (1, 2).

## AMENAZAS

Las principales causas de la regresión de la especie son debidas a la reducción de la laurisilva, la continuidad de aprovechamientos forestales en muchos montes privados (especialmente en La Palma) y la caza furtiva (1, 2).

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación y regeneración del hábitat. Persecución de la caza furtiva, especialmente en los bebederos. Esta última medida debe aplicarse enérgicamente en Hierro, donde la especie está a punto de extinguirse. Se recomienda el seguimiento continuo de sus poblaciones (1, 2).

## REFERENCIAS

1. Martín, A.; Hernández, E.; Nogales, M.; Quilis, V.; Trujillo, O., y Delgado, G. (1990): *Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Canarias*. Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

2. Emmerson, K. W. (1985): *Estudios de la biología y ecología de la Paloma turqué (Columba bollii) y la Paloma rabiche (Columba junoniae) con vistas a su conservación*. ICONA. Santa Cruz de Tenerife. Informe inédito.