



*Pelagodroma marina* Latham, 1790

Castellano: Paño pechialbo

## CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: EN PELIGRO

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

## DISTRIBUCION

ESPAÑA: Nidificante en escaso número en las Islas Canarias, donde se encuentra restringido a la pequeña isla de Montaña Clara (Lanzarote) (1).

CE: Cría también en las Islas Salvajes (Madeira) (2).

MUNDO: La subespecie *P. m. hypoleuca* es endémica de Canarias y Madeira. En el archipiélago de Cabo Verde (también incluido en la región macaronésica) cría *P. m. eadesi*, de la que no se tienen datos recientes sobre el tamaño y tendencia de sus poblaciones. Otras cuatro subespecies se distribuyen por el Atlántico sur, el Océano Índico y el Pacífico.

## HABITAT

Islas o islotes que dispongan de un sustrato arenoso cubierto de vegetación, suficientemente adecuado para excavar las huras en las que nidifica. Como otros paños, fuera de la época de cría es de costumbres pelágicas.

## POBLACION

La población española se ha descubierto muy recientemente y, aunque de escasa relevancia, tiene un gran interés corológico. Aunque en un principio se pensó que el número de aves nidificantes podría ser inferior a 10 parejas (1), recientes investigaciones arrojan cifras más optimistas (entre 15 y 18 nidos ocupados en 1992) (3). La población de Madeira se ha calculado, en aproximadamente, 25.000 parejas (2).

## AMENAZAS

En Canarias, el reducido tamaño de la población y el hecho de encontrarse acantonada en un área muy concreta implica que tengan que adaptarse con urgencia medidas para reducir o eliminar los factores de amenaza. Entre éstos destacan las visitas incontroladas al islote, la presencia de conejos (que destruyen las huras y favorecen la erosión del suelo) y la incidencia de depredadores naturales (lechuzas, gaviotas y cuervos) que, en ocasiones, llegan a especializarse en la captura de pequeños procelarifomes.

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Adquirir el islote y prohibir todo tipo de acceso, salvo el relacionado con fines de investigación y/o de gestión. Erradicación de la población de conejos y control de los predadores potenciales.

## REFERENCIAS

- 1 . Martín, A.; Delgado, G.; Nogales, M.; Quilis, V.; Trujillo, O.; Hernández, E., y Santana F. (1 989): "Premières données sur la nidification du Puffin des Anglais (*Puffinus puffinus*), du Pétrel-frégate (*Pelagodroma marina*) et de la Sterne de Dougali (*Sterna dougallii*) aux îles Canaries". *L'Oiseau et R. F. O.*, 59 (1): 73-83.
2. Hartog, J. C.; Norrevang, A., y Zino, P. A. (1 984): "Birds observations in the Seivagens Islands". *Bol. Mus. Mun. Funchal*, 36:111-141.
3. F. Rodríguez y V. Quilis: Comunicación personal, mayo de 1992.

---

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios. Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente