

CR

LABIATAE

Teucrium bracteatum Desf.



B. Cabezudo

Datos generales

Altitud: 300-1.030 m

Hábitat: Taludes arcillosos y canchales calizos fijados por la vegetación

Fitosociología: *Phlomis lychnitidis-Brachypodium ramosi* y *Ononidetalia ramossisimae*

Biotipo: Hemicriptófito perenne

Biología reproductiva: Monoica, alógama

Floración: V-VIII

Fructificación: VIII-IX

Expresión sexual: Hermafrodita

Polinización: Entomófila generalista

Dispersión: Bolocora y epizocora

Nº cromosómico: No conocido

Reproducción asexual: Rizomas

Identificación

Hierba perenne, rizomatosa. Tallos ascendentes o decumbentes. Hojas pecioladas, triangular-ovadas, cordadas y crenadas, de haz reticulado. Inflorescencia simple o ramificada, pseudo-verticilos con 6 flores. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado, tubular-campanulado, giboso. Corola crema o amarillenta, pseudo-bilabiada. Estambres con filamentos glabros. Núculas subglobosas, marrones, reticuladas y glabras.

Distribución

NO de África (Marruecos y Argelia) y SO de la Península Ibérica (Cádiz y Málaga).

Biología

Hermafrodita, entomófila generalista, bolocora y epizoocora; y reproducción vegetativa extensiva por rizomas.

Especie bético-rifeña que se distribuye en Andalucía en dos pequeñas áreas con pocos individuos y muy alejadas entre sí. Ambas poblaciones están muy afectadas por incendios, pastoreo y contaminación del hábitat.

Hábitat

Canchales calizos fijados por la vegetación y taludes arcillosos con nódulos de areniscas.

Demografía

Dos poblaciones, una en la sierra de Casarabonela (Málaga) con tan solo 7 individuos en un área de 20 m² y otra en Tarifa (Cádiz) con dos grupos de individuos, 25 y 5, en dos cuadrículas UTM diferentes y ocupando 5.000 y 1.000 m² respectivamente.

Amenazas

Realización y limpieza de cortafuegos, senderismo, pastoreo y residuos generados por el paso de vehículos (sólo en la población gaditana).

Conservación

La población gaditana se encuentra en la zona de contacto entre el P. Natural de los Alcornocales y el del Estrecho. La población malagueña está incluida en la Reserva de la Biosfera "Sierra de las Nieves y su entorno".

Medidas propuestas

Incluir la Sierra Prieta de Casarabonela en el P. Natural Sierra de las Nieves. Incluir la especie en el CNEA y en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Seguimiento de las dos poblaciones e inclusión de semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía.

Ficha Roja

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN	INDIVIDUOS	PRESENCIA (UTM 1x1 km)	AMENAZAS
Sierra de Casarabonela (Ma)	7 (D)	1	Pastoreo e incendios
Tarifa (Ca)	30 (D)	2	Pisoteo y antropización (basura)

**Corología**

UTM 1x1 visitadas:	23
UTM 1x1 confirmadas:	3
Poblaciones confirmadas:	2
Poblaciones estudiadas:	2
Poblaciones nuevas:	0
Poblaciones extintas:	0
Poblaciones espontáneas:	2
Poblaciones restituidas s.l.:	0
Poblaciones no confirmadas:	0
Poblaciones no visitadas:	0
Poblaciones descartadas:	0



Referencias: CABEZUDO *et al.* (2005); BALL (1878); DESFONTAINES (1798); NAVARRO & CABEZUDO (1997); WOLLEY (1949).

Autores: B. CABEZUDO, T. NAVARRO, A. V. PÉREZ LATORRE, R. MARTÍNEZ FLORIDO, J.A. GARCÍA ROJAS Y D. NAVAS.