

COMPOSITAE

Hieracium ramondii Griseb.

Endemismo pirenaico-cantábrico con, al menos, treinta poblaciones dispersas y sin amenazas destacadas.



P.R. Pulido

Identificación

Herbácea perenne, con tallos de 10-25 (35) cm. Hojas y tallos escasamente pilosos o glabrescentes, sin pelos glandulares (excepcionalmente con algunas microglándulas en los bordes de las hojas). Alvéolos del receptáculo floral con cilios cortos y abundantes. Estigmas amarillos.

Dentro de esta especie se reconocen tradicionalmente varias subespecies.

Distribución y hábitat

Endemismo pirenaico-cantábrico, con sus poblaciones repartidas puntualmente por el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava) y el Pirineo y Prepirineo centro-occidentales (Navarra, Huesca, Lleida)^{1,2}. Se encuentra también en la vertiente francesa del Pirineo.

Coloniza, principalmente, fisuras y rellanos de roquedos (tanto silíceos como calcáreos), pero también pedregales y pastos pedregosos de los pisos montano y subalpino. Frecuentemente acompañado por *Sesleria albicans*, *Asplenium trichomanes*, *Saxifraga hirsuta* y *Valeriana montana*.

Biología y demografía

Hemicriptófito de floración estival. Apomixia no comprobada, aunque se sabe que es frecuente en la familia y en el género.

Taxón con cerca de treinta poblaciones conocidas. Las estimaciones efectuadas en algunas de las poblaciones pirenaicas no pasan de los 300 individuos.


Amenazas y conservación

Su carácter eminentemente rupícola le permite escapar de las amenazas más comunes de origen antrópico. Las poblaciones visitadas muestran en general un buen estado de conservación; sólo algunas del Pirineo se ha visto que podrían estar siendo afectadas por el pastoreo.

Varias poblaciones están incluidas en territorios dotados de alguna protección legal: P. Nacionales de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) y de Aigües Tortes y Lago San Mauricio (Lleida), Reserva Natural de Larra (Navarra) y LIC de "Los Valles" (Huesca).

Se propone investigar la identidad genética de las poblaciones y aclarar la taxonomía infraespecífica, así como hacer una prospección más exhaustiva y detallada de su distribución y cuantificar sus efectivos.

Referencias: [1] ASEGINOLAZA *et al.* (1985); [2] VILLAR, SESÉ & FERNÁNDEZ (2001). **Agradecimientos:** Pedro Montserrat. **Autores:** Redactada con los datos de L. VILLAR y P. PULIDO.

**Datos generales**

Altitud: (500) 1.300-2.460 m
Hábitat: Roquedos y lugares pedregosos sombríos o frescos de los pisos montano y subalpino
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Dispersión: Anemocora

Ficha Roja

Categoría UICN para España: NT
Categoría UICN mundial:
 No evaluada
Figuras legales de protección:
 No existen

Corología

UTM 1x1 visitadas:	8
UTM 1x1 confirmadas:	5
Poblaciones confirmadas:	5
Poblaciones nuevas:	2
Poblaciones extintas:	0
Poblaciones restituidas:	0
Poblaciones no confirmadas:	0
Poblaciones no visitadas:	?
Poblaciones descartadas:	0