




RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

**RED DE NIVEL II
MEMORIA – 2015**

PARCELA 54 Ph (VALENCIA)



Tecmena, s.l.
TECNICAS DEL MEDIO NATURAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SILVICULTURA Y MONTES
ÁREA DE INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS FORESTALES**

Clara del Rey, 22
28002 Madrid
Tel. 91 413 70 07
Fax. 91 510 20 57
correo@tecmena.com

**20
15**

Índice

1. Situación de la parcela	1
2. Caracterización de la parcela	2
2.1. Climatología	2
2.2. Vegetación	2
2.3. Caracterización forestal y dasométrica	3
3. Estado fitosanitario de la parcela	4
3.1. Defoliación y decoloración	4
3.2. Daños forestales	5
4. Instrumentación	18
5. Deposición atmosférica	20
5.1. pH	22
5.2. Conductividad	23
5.3. Potasio	24
5.4. Calcio	25
5.5. Magnesio	26
5.6. Sodio	27
5.7. Amonio	28
5.8. Cloro	29
5.9. Nitratos	30
5.10. Sulfatos	31
5.11. Interpretación de resultados	32
6. Calidad del aire. Inmisión	32
7. Análisis foliar	34
7.1. Macronutrientes	34
7.2. Micronutrientes	36
7.3. Interpretación de resultados	36
8. Desfronde	37
9. Fenología	39
10. Cintas diamétricas	41

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: Características de la parcela.
TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.
TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009
TABLA 4: Características dasométricas
TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela
TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela
TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados
TABLA 8: Equipos de medición instalados
TABLA 9: Parámetros descriptores de la deposición atmosférica
TABLA 10: Caracterización pH
TABLA 11: Caracterización conductividad
TABLA 12: Caracterización potasio
TABLA 13: Caracterización calcio
TABLA 14: Caracterización magnesio
TABLA 15: Caracterización sodio
TABLA 16: Caracterización amonio
TABLA 17: Caracterización cloro
TABLA 18: Caracterización nitratos
TABLA 19: Caracterización sulfatos
TABLA 20: Inmisión atmosférica
TABLA 21: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Macronutrientes
TABLA 22: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Micronutrientes
TABLA 23: Resultados medios del análisis de desfronde

TABLA 24: Resultados de la evaluación fenológica

TABLA 25: Valor medio dendrómetros

INDICE DE FIGURAS

FIG 1: Posición y vistas de la parcela

FIG 2: Climodiagrama de la parcela

FIG 3: Caracterización dasométrica de la parcela

FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media

FIG 5: Tipos de defoliación

FIG 6: Daños forestales

FIG 7: Instrumentación

FIG 8: Variación temporal de pH

FIG 9: Variación temporal de conductividad

FIG 10: Variación temporal de potasio

FIG 11: Variación temporal de calcio

FIG 12: Variación temporal de magnesio

FIG 13: Variación temporal de sodio

FIG 14: Variación temporal de amonio

FIG 15: Variación temporal de cloro

FIG 16: Variación temporal de nitratos

FIG 17: Variación temporal de sulfatos

FIG 18: Variación temporal de inmisión por dosímetros

FIG 19: Evolución de macronutrientes

FIG 20: Evolución de micronutrientes

FIG 21: Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica

FIG 22: Fases fenológicas. Inicio de fase

FIG 23: Fases fenológicas

FIG 24: Crecimiento diametral anual

1. Situación de la parcela.

La parcela representa el pinar de *Pinus halepensis* del sector Setabense de la Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal. (Rivas-Martínez).

Sus principales características se resumen en la siguiente tabla:

TABLA 1: Características de la parcela.

PARCELA	ESPECIE	PROVINCIA	T. MUNICIPAL	REPLANTEO	NIVEL
54Ph	<i>Pinus halepensis</i>	Valencia	El Saler	2003	II

LATITUD	LONGITUD	XUTM	YUTM	ALTITUD	PENDIENTE	ORIENTACIÓN	PARAJE
+39°21'00"	-00°19'00"	731.000	4.359.000	50	2	Plana	El Saler



FIG 1: Posición y vistas de la parcela 54Ph.

2. Caracterización de la parcela.

2.1. Climatología.

Las principales características de la parcela se dan en la siguiente tabla:

TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
T(°C)	10,4	11,1	13,1	15,1	18,4	21,8	24,7	25,2	22,8	18,6	14,0	10,9	17,2
P(mm)	33	39	46	39	39	20	2	22	56	109	47	60	512
T. Media Máximas Mes más Cálido								30,8					
5,3		T. Media Mínimas Mes más Frío											

De acuerdo a clasificación de Allué, el clima se corresponde con un IV2 *Mediterráneo genuino*.

De acuerdo a la clasificación en pisos bioclimáticos, la parcela se encuentra en el *piso Termomediterráneo* en la *Región Mediterránea*.




FIG 2: Climodiagrama de la parcela.

2.2. Vegetación.

Vegetación actual: Se trata de un pinar de pino carrasco (*Pinus halepensis*) mezclado con algunos pies de eucalipto (*Eucalyptus rostrata*) con sotobosque de coscoja, zarzaparrilla y ramnus sobre una ladera de pendiente suave.

TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009

	Cob		Cob
ESTRATO ARBÓREO	70,0	<i>Echium vulgare L.</i>	+
<i>Pinus halepensis Miller</i>	70,0	<i>Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis</i>	+
ESTRATO ARBUSTIVO	33,0	<i>Geranium molle L.</i>	+
<i>Chamaerops humilis L.</i>	0,2	<i>Juncus acutus L.</i>	+
<i>Phillyrea angustifolia L.</i>	0,8	<i>Mercurialis annua L.</i>	+
<i>Phillyrea latifolia L.</i>	3,0	<i>Osyris quadripartita Salzm. ex Decne</i>	5,0
<i>Quercus coccifera L.</i>	5,0	<i>Parietaria judaica L.</i>	+
<i>Rhamnus alaternus L.</i>	2,0	<i>Piptatherum miliaceum (L.) Cosson</i>	+
<i>Rhamnus lycioides L.</i>	2,0	<i>Pistacia lentiscus L.</i>	70,0
<i>Smilax aspera L.</i>	20,0	<i>Rubia peregrina L.</i>	+
EST. SUBARBUSTIVO-HERBACEO	78,5	<i>Ruscus aculeatus L.</i>	+
<i>Asparagus acutifolius L.</i>	+	<i>Scirpus holoschoenus L.</i>	+
<i>Bromus rigidus Roth</i>	+	<i>Sonchus tenerrimus L.</i>	+
<i>Centaurea aspera L.</i>	+		



Vegetación potencial: La parcela se encuentra en la zona de transición entre la serie de vegetación (I) Geomacroserie de saladares y salinas y la (III) Geomacroserie de las dunas y arenales costeros.


2.3. Caracterización forestal y dasométrica.

La parcela se sitúa en una masa monoespecífica irregular de pino carrasco, cuyas características principales se resumen a continuación:

TABLA 4: Características dasométricas. Área de la parcela, número de pies en la parcela, densidad en pies/ha, Número de pies de la especie principal, número de pies de otras especies, número de pies muertos, edad media, diámetro medio, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, altura media, altura dominante, existencias.

Parcela	Área ha	N par	N/ha	Sp.p	Otras	Muerto	Edad años	D med (cm)	AB m ² /ha	D m c cm	Alt m m	Alt do m	Exist m ³ cc
54Ph	0.25	33	132	30	3	3	40-60	37,38	16,35	39,71	12,86	14,58	20,70





CD	N parc	N ha	h	Esb	Exist parc	Exist ha
7,5 - 12,5	1	4	9,5	95,02	0,02	0,07
12,5 - 17,5	2	8	10,2	67,98	0,11	0,43
17,5 - 22,5	4	16	10,8	54,24	0,61	2,43
22,5 - 27,5	2	8	11,5	45,81	0,40	1,59
27,5 - 32,5	4	16	12,0	40,05	1,28	5,11
32,5 - 37,5	4	16	12,5	35,80	1,81	7,25
37,5 - 42,5	3	12	13,0	32,50	1,81	7,24
42,5 - 47,5	5	20	13,4	29,83	3,92	15,68
47,5 - 52,5	1	4	13,8	27,61	1,08	4,31
52,5 - 57,5	2	8	14,1	25,71	2,57	10,30
57,5 - 62,5	2	8	14,4	24,05	2,96	11,84
62,5 - 67,5	2	8	14,7	22,58	4,14	16,54
> 67,5						
TOTAL	33	132			20,70	82,80

FIG 3: Distribución diamétrica de la parcela; distribución de alturas y comparación con las alturas media y dominante; relación de alturas-diámetros; frecuencias, alturas, esbelteces y existencias por clase diamétrica.

3. Estado fitosanitario de la parcela.

3.1. Defoliación y decoloración.

La parcela, tras su replanteo e instrumentación en 2003, se adscribió formalmente a la Red de Nivel II en España en la evaluación de 2006, primer año en que se evaluó su estado fitosanitario conforme a la normativa europea en materia de redes forestales. No constan así datos anteriores a 2006.

En la presente revisión, la parcela presenta un estado fitosanitario mediocre, con una defoliación media del 27,12% dentro por tanto de la escala de daños ligeros si bien en su umbral superior, categoría en la que se han calificado cerca del 70% de los pies, en lo que supone un empeoramiento con respecto a la revisión anterior, con un aumento de algo más de dos puntos porcentuales, inferior sin embargo al umbral de cinco que supone una variación significativa en términos estadísticos, de acuerdo con la normativa europea en materia de redes forestales, debido sobre todo a la muerte de uno de los pies muestra debido a la acción de insectos perforadores, sobre un árbol que venía ya mostrando síntomas de decaimiento. Eliminado este efecto distorsionador, el arbolado presenta un estado general similar al del año pasado.

Atendiendo a la serie histórica de datos, y tras el brusco empeoramiento habido en 2013, cuando la defoliación media se situó claramente dentro de la escala de daños moderados, parece recuperarse la estabilidad que venía presentando la población, en torno a valores del 20-25%, a la vez que continúa advirtiéndose el lento pero progresivo deterioro de la masa, tras el mínimo local habido en 2010; muy marcado en el último trienio.

Continuando con esta idea de estabilidad del estado fitosanitario del arbolado, y en lo que se refiere a la decoloración, el segundo gran parámetro definitorio de su estado de salud, se advierte también un comportamiento muy estable, en niveles algo inferiores a los encontrados el año pasado, al afectar en modo ligero a cerca de la mitad de la parcela.

Los principales resultados pueden verse en el gráfico adjunto:




FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media de la parcela. Serie histórica.



FIG 5: Defoliación 20%, 25% y 35%

3.2. Daños forestales.

Los principales **agentes dañinos** identificados se resumen en la siguiente tabla, indicándose el número de pies afectados, sus características dendrométricas, defoliación y decoloración asociadas y la diferencia con los valores medios de la parcela.

TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
INSECTOS												
Perforadores	2	1,00	8	6,06	27,50	0,50	0,38	-0,05	39,00	13,20	1,63	0,34
<i>Dioryctria splendidella</i>	1	1,00	4	3,03	35,00	1,00	7,88	0,45	32,00	11,70	-5,38	-1,16
Tronco	1	1,00	4	3,03	35,00	1,00	7,88	0,45	32,00	11,70	-5,38	-1,16
<i>Tomicus destruens</i>	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	46,00	14,70	8,63	1,84
Ramillos <2 cm	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	46,00	14,70	8,63	1,84
Chupadores	22	1,00	88	66,67	24,55	0,32	-2,57	-0,23	36,55	13,16	-0,83	0,30
Acíc. antiguas	14	1,00	56	42,42	24,64	0,36	-2,48	-0,19	38,86	12,39	1,48	-0,47
Acíc. todas edades	2	1,00	8	6,06	27,50	0,50	0,38	-0,05	25,00	11,60	-12,38	-1,26
<i>Glycaspis brimblecombei</i>	3	1,00	12	9,09	23,33	0,00	-3,79	-0,55	23,33	16,43	-14,04	3,57
Hojas	3	1,00	12	9,09	23,33	0,00	-3,79	-0,55	23,33	16,43	-14,04	3,57
<i>Leucaspis pini</i>	2	1,00	8	6,06	22,50	0,50	-4,62	-0,05	57,00	13,50	19,63	0,64
Acíc. antiguas	2	1,00	8	6,06	22,50	0,50	-4,62	-0,05	57,00	13,50	19,63	0,64
<i>Pulgonas</i>	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	26,00	16,60	-11,38	3,74
Hojas	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	26,00	16,60	-11,38	3,74
Form. Agallas	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	22,00	17,10	-15,38	4,24
Hojas	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	22,00	17,10	-15,38	4,24
ENFERMEDADES												
Hongos/Royas acíc	6	1,00	24	18,18	23,33	0,67	-3,79	0,12	42,67	12,73	5,29	-0,13
<i>Thyriopsis halepensis</i>	6	1,00	24	18,18	23,33	0,67	-3,79	0,12	42,67	12,73	5,29	-0,13
Acíc. antiguas	6	1,00	24	18,18	23,33	0,67	-3,79	0,12	42,67	12,73	5,29	-0,13
Tizón	18	1,06	72	54,55	25,56	0,61	-1,56	0,06	38,72	12,21	1,35	-0,65
<i>Sirococcus conigenus</i>	18	1,06	72	54,55	25,56	0,61	-1,56	0,06	38,72	12,21	1,35	-0,65
Acíc. antiguas	2	1,00	8	6,06	25,00	0,50	-2,12	-0,05	39,00	12,50	1,63	-0,36
Acíc. todas edades	6	1,17	24	18,18	25,83	0,67	-1,29	0,12	40,17	12,07	2,79	-0,79
Ramillos <2 cm	6	1,00	24	18,18	26,67	0,67	-0,45	0,12	39,17	12,07	1,79	-0,79
Ramas tam. variable	4	1,00	16	12,12	23,75	0,50	-3,37	-0,05	35,75	12,48	-1,63	-0,38
AG.ABIÓTICOS												
Fact. físicos	4	1,00	16	12,12	22,50	0,25	-4,62	-0,30	49,25	12,58	11,88	-0,28
Tronco	4	1,00	16	12,12	22,50	0,25	-4,62	-0,30	49,25	12,58	11,88	-0,28
Sequía	3	1,00	12	9,09	21,67	0,33	-5,45	-0,22	50,67	13,63	13,29	0,77
Acíc. antiguas	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	46,00	14,70	8,63	1,84
Acíc. todas edades	1	1,00	4	3,03	25,00	1,00	-2,12	0,45	39,00	13,30	1,63	0,44
Ramillos <2 cm	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	67,00	12,90	29,63	0,04
Calor	18	1,11	72	54,55	25,00	0,50	-2,12	-0,05	35,17	12,66	-2,21	-0,20
Acíc. del año	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	59,00	15,90	21,63	3,04
Acíc. antiguas	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	52,00	19,60	14,63	6,74
Acíc. todas edades	4	1,00	16	12,12	22,50	0,50	-4,62	-0,05	29,00	12,03	-8,38	-0,83
Brotos del año	12	1,17	48	36,36	26,25	0,58	-0,87	0,03	33,83	12,03	-3,54	-0,83
Viento/Tornado	4	1,75	16	12,12	22,50	0,50	-4,62	-0,05	58,50	16,40	21,13	3,54
Ramas tam. variable	2	1,50	8	6,06	20,00	0,50	-7,12	-0,05	57,50	14,95	20,13	2,09
Tronco	2	2,00	8	6,06	25,00	0,50	-2,12	-0,05	59,50	17,85	22,13	4,99
ANTRÓPICOS												
Daños antrópicos	2	1,00	8	6,06	22,50	0,00	-4,62	-0,55	24,00	16,85	-13,38	3,99
Tronco	2	1,00	8	6,06	22,50	0,00	-4,62	-0,55	24,00	16,85	-13,38	3,99
Podas	10	1,00	40	30,30	26,00	0,50	-1,12	-0,05	38,10	12,69	0,73	-0,17

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Tronco	10	1,00	40	30,30	26,00	0,50	-1,12	-0,05	38,10	12,69	0,73	-0,17
Op. en pies próximos	1	1,00	4	3,03	20,00	1,00	-7,12	0,45	21,00	10,30	-16,38	-2,56
Tronco	1	1,00	4	3,03	20,00	1,00	-7,12	0,45	21,00	10,30	-16,38	-2,56
OTROS DAÑOS												
Plantas parásitas	9	2,00	36	27,27	25,56	0,33	-1,56	-0,22	39,78	11,63	2,40	-1,23
<i>Smilax aspera</i>	9	2,00	36	27,27	25,56	0,33	-1,56	-0,22	39,78	11,63	2,40	-1,23
Ramas >10 cm	1	2,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	43,00	14,00	5,63	1,14
Ramas tam. variable	6	2,33	24	18,18	26,67	0,17	-0,45	-0,38	38,33	11,12	0,96	-1,74
Tronco	2	1,00	8	6,06	25,00	1,00	-2,12	0,45	42,50	12,00	5,13	-0,86
Bacillus vuilemini	2	1,00	8	6,06	25,00	0,00	-2,12	-0,55	44,50	10,80	7,13	-2,06
Ramas 2-10 cm	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	56,00	12,10	18,63	-0,76
Ramas >10 cm	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	33,00	9,50	-4,38	-3,36
Falta luz	6	1,00	24	18,18	22,50	0,50	-4,62	-0,05	39,50	12,37	2,13	-0,49
Ramillos <2 cm	1	1,00	4	3,03	20,00	1,00	-7,12	0,45	21,00	10,30	-16,38	-2,56
Ramas >10 cm	1	1,00	4	3,03	20,00	1,00	-7,12	0,45	58,00	14,90	20,63	2,04
Ramas tam. variable	4	1,00	16	12,12	23,75	0,25	-3,37	-0,30	39,50	12,25	2,13	-0,61
Inter.físicas	2	1,00	8	6,06	25,00	0,50	-2,12	-0,05	40,50	12,65	3,13	-0,21
Ramas 2-10 cm	2	1,00	8	6,06	25,00	0,50	-2,12	-0,05	40,50	12,65	3,13	-0,21
Compet/Espesura	8	5,00	32	24,24	26,88	0,63	-0,25	0,08	23,75	10,24	-13,63	-2,62
Tronco	8	5,00	32	24,24	26,88	0,63	-0,25	0,08	23,75	10,24	-13,63	-2,62
AG.DESCONOCIDO												
Ag.desconocido	39	1,08	156	100,00	25,51	0,51	-1,61	-0,04	38,51	13,33	1,14	0,47
Acíc. del año	2	1,00	8	6,06	22,50	1,00	-4,62	0,45	17,50	9,95	-19,88	-2,91
Acíc. antiguas	6	1,00	24	18,18	25,00	0,33	-2,12	-0,22	42,83	12,77	5,46	-0,09
Acíc. todas edades	6	1,33	24	18,18	30,00	0,67	2,88	0,12	35,17	12,22	-2,21	-0,64
Hojas	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	22,00	15,60	-15,38	2,74
Ramillos <2 cm	2	1,00	8	6,06	25,00	0,00	-2,12	-0,55	24,00	16,10	-13,38	3,24
Ramas tam. variable	6	1,17	24	18,18	27,50	0,83	0,38	0,28	40,67	13,93	3,29	1,07
Tronco	16	1,00	64	48,48	23,75	0,44	-3,37	-0,11	42,81	13,66	5,44	0,80

En cuanto al conjunto de agentes de daño identificados, destaca en primer lugar la presencia de insectos, particularmente de **chupadores** presentes en más de la mitad del arbolado, en lo que supone un incremento en su nivel de acción con respecto a la pasada revisión, aunque en general –y como suele ser habitual en este tipo de insectos– los daños encontrados son escasos, asociados en la mayoría de los casos a punteaduras y bandeos amarillentos en las acículas de más edad, unidos a pequeños picotazos en el interior de la zona decolorada causados por la entrada del aparato succionador del insecto y que en algún caso aparecen taponados por una pequeña gota de resina que sella el orificio y se puede advertir al tacto. La succión de los jugos de la acícula causa la desecación del tejido próximo y en un nivel más avanzado puede llegar a causar la caída de la hoja afectada. Se advierten también las típicas escamaciones blanquecinas en las acículas debidas a la acción de *Leucaspis pini* diáspido muy frecuente en los pinares españoles, y que no se ha encontrado asociado a daños de consideración. Sobre los pocos eucaliptos acompañantes se advierten también rastros del también chupador *Glycaspis brimblecombei* homóptero de reciente cita en España y que parece estar aumentando su nivel de actividad en los últimos años; de quien se ven las típicas formaciones en escudetes blanquecinos en el haz foliar. Por último cabe destacar la aparición de alguna perforación en el tronco causada por *Dioryctria splendidella* de donde mana la habitual secreción de resina tintada de rojo debido a los restos de la galería larvaria, asociada a defoliaciones elevadas, lo que pondría de manifiesto su potencial peligrosidad, así como algún ramillo superior muerto por la acción del escolíto *Tomicus destruens* muy frecuente en el levante español y de quien se han registrado ataques de cierta importancia, aunque no aparece asociado a daños forestales de importancia en el momento de la evaluación.

Al igual que en años anteriores si bien en tasas mucho más reducidas, continúa advirtiéndose la presencia del hongo defoliador *Thyriopsis halepensis* sobre el pino carrasco, de quien se ven las habituales punteaduras necróticas amarillentas orladas de un cerco de cuerpos de fructificación negruzcos y que acaban por causar la pérdida de las acículas de más edad, y concentrándose sobre las ramas más bajas, superponiéndose y amplificando los efectos de la autopoda, conformándose copas de apariencia muy transparente. Se advierte también la presencia de la enfermedad conocida como “soflamado del carrasco” causada por el hongo *Sirococcus conigenus* en más de la mitad de la población, en lo que supone un nuevo incremento con respecto al año precedente y a quien se asocia la aparición de cortos penachos de acículas muertas y colgantes concentradas sobre todo en la ramificación más baja, que en su progresión pueden llegar a matar a ramillos enteros, dando un aspecto muy característico al pie afectado.

Se registran también daños por agentes bióticos, tales como el **viento**, frecuente en una zona de litoral muy próxima al mar como la que nos ocupa, que ha causado rotura de ramas en una pequeña fracción de los árboles muestreados, con roturas en ocasiones cicatrizadas, concentradas en pies de tamaño superior al vuelo medio de la parcela, donde se pierde el efecto coprotector de la masa quedando más expuestos a tormentas o vendavales; junto con daños por **golpe de calor** más de la mitad de los pies evaluados en una considerable expansión respecto a la revisión anterior, lo que no resulta extraño en uno de los años en los que se han alcanzado máximos en los registros históricos de temperaturas. El fenómeno se ha asociado a amarilleamientos en las acículas más antiguas y sobre todo al aborto de brotes del año, en los que la elongación de la metida inicial propia de la primavera no se ha visto seguido del desarrollo posterior de las acículas, que no han llegado a desplegarse.

Al igual que en años anteriores se observan daños en los troncos por **podas** antiguas en la tercera parte de los pies evaluados, sin mayor trascendencia sobre el estado de salud de la masa toda vez que se trata de heridas ya cicatrizadas, así como algunas heridas en los troncos por acción fortuita del hombre, sin incidencia sobre el estado de salud general de los pies afectados.

Es frecuente también la aparición de epifitas en los troncos, destacando la presencia de *Smilax aspera* en algo más de la cuarta parte de los pies, en un nivel de acción muy similar al del año pasado, que en algún caso concreto llega a afectar a las ramas más bajas, no descartándose que pudiera llegar a ahogar a parte del follaje del árbol en un futuro. La afección es más frecuente sobre los pies de menor tamaño que la epifita tiene más fácil colonizar desde el suelo. Se ha observado también alguna tumoración relacionada con la tuberculosis del carrasco, asociada a *Bacillus vuilemini* sin mayor importancia, mientras que sí se advierten daños por **competencia** o **falta de luz** en varios de los pies evaluados, los de menores dimensiones que quedan bajo el dosel principal de copas, y de quien sí se ven defoliaciones de consideración asociadas, poniendo de manifiesto el peligro potencial de este tipo de daños, que suelen manifestarse en pérdida de las acículas de las metidas más antiguas de forma que los ramillos afectados quedan poblados por un corto penacho de acículas en posición distal, permaneciendo desnudo el resto de su longitud.

Por último, y sin que pueda determinarse la causa con exactitud, se registra algún fenómeno aislado de **enrojecimiento** o **enrollamiento** de las acículas de mayor edad, junto con **puntisecado** de ramillos, alguna **resinosis** o **exudaciones** en los troncos de escasa trascendencia fitosanitaria, pero que llegan a afectar a casi la mitad de los árboles evaluados.

El conjunto de **síntomas y signos** observados se resumen en la tabla adjunta.

TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
HOJAS/ACÍCULAS												
Acíc. del año	3	1,00	12	9,09	21,67	0,67	-5,45	0,12	31,33	11,93	-6,04	-0,93
Dec. Rojo-marrón	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	59,00	15,90	21,63	3,04
Completa	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	59,00	15,90	21,63	3,04
Deformaciones	2	1,00	8	6,06	22,50	1,00	-4,62	0,45	17,50	9,95	-19,88	-2,91
Enrolladas	2	1,00	8	6,06	22,50	1,00	-4,62	0,45	17,50	9,95	-19,88	-2,91
Acíc. antiguas	32	1,00	128	96,97	24,22	0,41	-2,90	-0,14	42,09	12,90	4,72	0,04
Dec. Verde-amarillo	18	1,00	72	54,55	25,28	0,39	-1,84	-0,16	38,44	12,61	1,07	-0,25
Punteado	6	1,00	24	18,18	25,83	0,33	-1,29	-0,22	34,33	12,63	-3,04	-0,23
Bandeado	7	1,00	28	21,21	24,29	0,43	-2,83	-0,12	39,86	11,67	2,48	-1,19
Apical	5	1,00	20	15,15	26,00	0,40	-1,12	-0,15	41,40	13,88	4,03	1,02
Dec. Rojo-marrón	5	1,00	20	15,15	23,00	0,20	-4,12	-0,35	47,80	13,54	10,43	0,68
Completa	3	1,00	12	9,09	25,00	0,33	-2,12	-0,22	44,67	12,37	7,29	-0,49
Punteado	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	59,00	15,90	21,63	3,04
Parcial	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	46,00	14,70	8,63	1,84
Microfilia	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	46,00	14,70	8,63	1,84
Signos insectos	2	1,00	8	6,06	22,50	0,50	-4,62	-0,05	57,00	13,50	19,63	0,64
Adultos,larvas,ninfas	2	1,00	8	6,06	22,50	0,50	-4,62	-0,05	57,00	13,50	19,63	0,64
Signos hongos	6	1,00	24	18,18	23,33	0,67	-3,79	0,12	42,67	12,73	5,29	-0,13
C.fructificación	6	1,00	24	18,18	23,33	0,67	-3,79	0,12	42,67	12,73	5,29	-0,13
Acíc. todas edades	19	1,16	76	57,58	26,58	0,63	-0,54	0,08	34,58	12,12	-2,80	-0,74
Comidos/perdidos	1	2,00	4	3,03	30,00	1,00	2,88	0,45	42,00	12,60	4,63	-0,26
Caída prematura	1	2,00	4	3,03	30,00	1,00	2,88	0,45	42,00	12,60	4,63	-0,26
Dec. Verde-amarillo	5	1,00	20	15,15	24,00	0,40	-3,12	-0,15	30,40	12,34	-6,98	-0,52
Punteado	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	36,00	14,50	-1,38	1,64
Bandeado	1	1,00	4	3,03	35,00	1,00	7,88	0,45	14,00	8,70	-23,38	-4,16
Apical	3	1,00	12	9,09	21,67	0,33	-5,45	-0,22	34,00	12,83	-3,38	-0,03
Dec. Rojo-marrón	12	1,17	48	36,36	27,50	0,67	0,38	0,12	35,33	11,89	-2,04	-0,97
Completa	12	1,17	48	36,36	27,50	0,67	0,38	0,12	35,33	11,89	-2,04	-0,97
Microfilia	1	1,00	4	3,03	25,00	1,00	-2,12	0,45	39,00	13,30	1,63	0,44
Hojas	6	1,00	24	18,18	23,33	0,00	-3,79	-0,55	23,33	16,43	-14,04	3,57
Dec. Rojo-marrón	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	22,00	15,60	-15,38	2,74
Completa	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	22,00	15,60	-15,38	2,74
Deformaciones	2	1,00	8	6,06	22,50	0,00	-4,62	-0,55	24,00	16,85	-13,38	3,99
Enrolladas	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	26,00	16,60	-11,38	3,74
Agallas	1	1,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	22,00	17,10	-15,38	4,24
Signos insectos	3	1,00	12	9,09	23,33	0,00	-3,79	-0,55	23,33	16,43	-14,04	3,57
Adultos,larvas,ninfas	3	1,00	12	9,09	23,33	0,00	-3,79	-0,55	23,33	16,43	-14,04	3,57
RAMAS/BROTES												
Brotos del año	12	1,17	48	36,36	26,25	0,58	-0,87	0,03	33,83	12,03	-3,54	-0,83
Aborto	12	1,17	48	36,36	26,25	0,58	-0,87	0,03	33,83	12,03	-3,54	-0,83
Ramillos <2 cm	11	1,00	44	33,33	24,55	0,45	-2,57	-0,10	37,91	12,95	0,53	0,10
Muerto/moribundo	11	1,00	44	33,33	24,55	0,45	-2,57	-0,10	37,91	12,95	0,53	0,10
Ramas 2-10 cm	3	1,00	12	9,09	25,00	0,33	-2,12	-0,22	45,67	12,47	8,29	-0,39
Deformaciones	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	56,00	12,10	18,63	-0,76
Tumores	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	56,00	12,10	18,63	-0,76

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Rotura	2	1,00	8	6,06	25,00	0,50	-2,12	-0,05	40,50	12,65	3,13	-0,21
Ramas >10 cm	3	1,33	12	9,09	21,67	0,33	-5,45	-0,22	44,67	12,80	7,29	-0,06
Deformaciones	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	33,00	9,50	-4,38	-3,36
Tumores	1	1,00	4	3,03	25,00	0,00	-2,12	-0,55	33,00	9,50	-4,38	-3,36
Otros signos	1	2,00	4	3,03	20,00	0,00	-7,12	-0,55	43,00	14,00	5,63	1,14
Muerto/moribundo	1	1,00	4	3,03	20,00	1,00	-7,12	0,45	58,00	14,90	20,63	2,04
Ramas tam. variable	22	1,45	88	66,67	25,23	0,45	-1,89	-0,10	40,45	12,69	3,08	-0,17
Otros signos	6	2,33	24	18,18	26,67	0,17	-0,45	-0,38	38,33	11,12	0,96	-1,74
Rotura	2	1,50	8	6,06	20,00	0,50	-7,12	-0,05	57,50	14,95	20,13	2,09
Muerto/moribundo	14	1,07	56	42,42	25,36	0,57	-1,76	0,02	38,93	13,04	1,55	0,18
TRONCO/C.RAÍZ												
Tronco	46	1,74	184	100,00	24,89	0,50	-2,23	-0,05	38,22	12,89	0,84	0,03
Deformaciones	5	1,00	20	15,15	22,00	0,20	-5,12	-0,35	37,80	14,38	0,43	1,52
Otras deformaciones	3	1,00	12	9,09	21,67	0,33	-5,45	-0,22	47,00	12,73	9,63	-0,13
Tumores	2	1,00	8	6,06	22,50	0,00	-4,62	-0,55	24,00	16,85	-13,38	3,99
Otros signos	2	1,00	8	6,06	25,00	1,00	-2,12	0,45	42,50	12,00	5,13	-0,86
Heridas	13	1,15	52	39,39	25,77	0,46	-1,35	-0,09	42,77	13,44	5,39	0,58
Grietas	3	1,67	12	9,09	25,00	0,33	-2,12	-0,22	58,33	15,93	20,96	3,07
Otras heridas	10	1,00	40	30,30	26,00	0,50	-1,12	-0,05	38,10	12,69	0,73	-0,17
Resinosis	18	1,00	72	54,55	24,17	0,50	-2,95	-0,05	41,00	13,36	3,63	0,50
Inclinado	8	5,00	32	24,24	26,88	0,63	-0,25	0,08	23,75	10,24	-13,63	-2,62

Por último, se presenta a continuación la relación entre agentes dañinos identificados y los distintos síntomas observados.

TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados.

	N par	Perforadores		Chupadores		Form. Agallas		Hongos/Royas acíc		Tizón	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS											
Acíc. del año	3										
Dec. Rojo-marrón	1										
Completa	1										
Deformaciones	2										
Enrolladas	2										
Acíc. antiguas	32			16	72,73			6	100,00	2	11,11
Dec. Verde-amarillo	18			13	59,09						
Punteado	6			6	27,27						
Bandeado	7			7	31,82						
Apical	5										
Dec. Rojo-marrón	5			1	4,55					2	11,11
Completa	3									2	11,11
Punteado	1			1	4,55						
Parcial	1										
Microfilia	1										
Signos insectos	2			2	9,09						
Adultos,larvas,ninfas	2			2	9,09						

	N par	Perforadores		Chupadores		Form. Agallas		Hongos/Royas acíc		Tizón	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Signos hongos	6							6	100,00		
C.fructificación	6							6	100,00		
Acíc. todas edades	19			2	9,09					6	33,33
Comidos/perdidos	1										
Caída prematura	1										
Dec. Verde-amarillo	5			2	9,09						
Punteado	1			1	4,55						
Bandeado	1			1	4,55						
Apical	3										
Dec. Rojo-marrón	12									6	33,33
Completa	12									6	33,33
Microfilia	1										
Hojas	6			4	18,18	1	100,00				
Dec. Rojo-marrón	1										
Completa	1										
Deformaciones	2			1	4,55	1	100,00				
Enrolladas	1			1	4,55						
Agallas	1					1	100,00				
Signos insectos	3			3	13,64						
Adultos,larvas,ninfas	3			3	13,64						
RAMAS/BROTOS											
Brotos del año	12										
Aborto	12										
Ramillos <2 cm	11	1	50,00							6	33,33
Muerto/moribundo	11	1	50,00							6	33,33
Ramas 2-10 cm	3										
Deformaciones	1										
Tumores	1										
Rotura	2										
Ramas >10 cm	3										
Deformaciones	1										
Tumores	1										
Otros signos	1										
Muerto/moribundo	1										
Ramas tam. variable	22									4	22,22
Otros signos	6										
Rotura	2										
Muerto/moribundo	14									4	22,22
TRONCO/C.RAÍZ											
Tronco	46	1	50,00								
Deformaciones	5										
Otras deformaciones	3										
Tumores	2										
Otros signos	2										
Heridas	13										
Grietas	3										
Otras heridas	10										
Resinosis	18	1	50,00								
Inclinado	8										

	N par	Fact. físicos		Sequía		Calor		Viento/ Tornado		Daños antrópicos	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS											
Acíc. del año	3					1	5,56				
Dec. Rojo-marrón	1					1	5,56				
Completa	1					1	5,56				
Deformaciones	2										
Enrolladas	2										
Acíc. antiguas	32			1	33,33	1	5,56				
Dec. Verde-amarillo	18					1	5,56				
Punteado	6										
Bandeado	7										
Apical	5					1	5,56				
Dec. Rojo-marrón	5										
Completa	3										
Punteado	1										
Parcial	1										
Microfilia	1			1	33,33						
Signos insectos	2										
Adultos,larvas,ninfas	2										
Signos hongos	6										
C.fructificación	6										
Acíc. todas edades	19			1	33,33	4	22,22				
Comidos/perdidos	1										
Caída prematura	1										
Dec. Verde-amarillo	5					3	16,67				
Punteado	1										
Bandeado	1										
Apical	3					3	16,67				
Dec. Rojo-marrón	12					1	5,56				
Completa	12					1	5,56				
Microfilia	1			1	33,33						
Hojas	6										
Dec. Rojo-marrón	1										
Completa	1										
Deformaciones	2										
Enrolladas	1										
Agallas	1										
Signos insectos	3										
Adultos,larvas,ninfas	3										
RAMAS/BROTES											
Brotos del año	12					12	66,67				
Aborto	12					12	66,67				
Ramillos <2 cm	11			1	33,33						
Muerto/moribundo	11			1	33,33						
Ramas 2-10 cm	3										
Deformaciones	1										
Tumores	1										
Rotura	2										
Ramas >10 cm	3										

	N par	Fact. físicos		Sequía		Calor		Viento/ Tornado		Daños antrópicos	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Deformaciones	1										
Tumores	1										
Otros signos	1										
Muerto/moribundo	1										
Ramas tam. variable	22							2	50,00		
Otros signos	6										
Rotura	2							2	50,00		
Muerto/moribundo	14										
TRONCO/C.RAÍZ											
Tronco	46	4	100,00					2	50,00	2	100,00
Deformaciones	5	3	75,00							2	100,00
Otras deformaciones	3	3	75,00								
Tumores	2									2	100,00
Otros signos	2										
Heridas	13	1	25,00					2	50,00		
Grietas	3	1	25,00					2	50,00		
Otras heridas	10										
Resinosis	18										
Inclinado	8										

	N par	Podas		Op. en pies próximos		Plantas parásitas		<i>Bacillus vullemini</i>		Falta luz	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS											
Acíc. del año	3										
Dec. Rojo-marrón	1										
Completa	1										
Deformaciones	2										
Enrolladas	2										
Acíc. antiguas	32										
Dec. Verde-amarillo	18										
Punteado	6										
Bandeado	7										
Apical	5										
Dec. Rojo-marrón	5										
Completa	3										
Punteado	1										
Parcial	1										
Microfilia	1										
Signos insectos	2										
Adultos, larvas, ninfas	2										
Signos hongos	6										
C.fructificación	6										
Acíc. todas edades	19										
Comidos/perdidos	1										
Caída prematura	1										
Dec. Verde-amarillo	5										
Punteado	1										

	N par	Podas		Op. en pies próximos		Plantas parásitas		<i>Bacillus vuilemini</i>		Falta luz	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Bandeado	1										
Apical	3										
Dec. Rojo-marrón	12										
Completa	12										
Microfilia	1										
Hojas	6										
Dec. Rojo-marrón	1										
Completa	1										
Deformaciones	2										
Enrolladas	1										
Agallas	1										
Signos insectos	3										
Adultos, larvas, ninfas	3										
RAMAS/BROTOS											
Brotos del año	12										
Aborto	12										
Ramillos <2 cm	11									1	16,67
Muerto/moribundo	11									1	16,67
Ramas 2-10 cm	3							1	50,00		
Deformaciones	1							1	50,00		
Tumores	1							1	50,00		
Rotura	2										
Ramas >10 cm	3					1	11,11	1	50,00	1	16,67
Deformaciones	1							1	50,00		
Tumores	1							1	50,00		
Otros signos	1					1	11,11				
Muerto/moribundo	1									1	16,67
Ramas tam. variable	22					6	66,67			4	66,67
Otros signos	6					6	66,67				
Rotura	2										
Muerto/moribundo	14									4	66,67
TRONCO/C.RAÍZ											
Tronco	46	10	100,00	1	100,00	2	22,22				
Deformaciones	5										
Otras deformaciones	3										
Tumores	2										
Otros signos	2					2	22,22				
Heridas	13	10	100,00								
Grietas	3										
Otras heridas	10	10	100,00								
Resinosis	18			1	100,00						
Inclinado	8										


	N par	Inter.físicas		Compet/Espesura		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS							
Acíc. del año	3					2	5,13
Dec. Rojo-marrón	1						

	N par	Inter.físicas		Compet/Espesura		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
Completa	1						
Deformaciones	2					2	5,13
Enrolladas	2					2	5,13
Acíc. antiguas	32					6	15,38
Dec. Verde-amarillo	18					4	10,26
Punteado	6						
Bandeado	7						
Apical	5					4	10,26
Dec. Rojo-marrón	5					2	5,13
Completa	3					1	2,56
Punteado	1						
Parcial	1					1	2,56
Microfilia	1						
Signos insectos	2						
Adultos,larvas,ninfas	2						
Signos hongos	6						
C.fructificación	6						
Acíc. todas edades	19					6	15,38
Comidos/perdidos	1					1	2,56
Caída prematura	1					1	2,56
Dec. Verde-amarillo	5						
Punteado	1						
Bandeado	1						
Apical	3						
Dec. Rojo-marrón	12					5	12,82
Completa	12					5	12,82
Microfilia	1						
Hojas	6					1	2,56
Dec. Rojo-marrón	1					1	2,56
Completa	1					1	2,56
Deformaciones	2						
Enrolladas	1						
Agallas	1						
Signos insectos	3						
Adultos,larvas,ninfas	3						
RAMAS/BROTOS							
Brotos del año	12						
Aborto	12						
Ramillos <2 cm	11					2	5,13
Muerto/moribundo	11					2	5,13
Ramas 2-10 cm	3	2	100,00				
Deformaciones	1						
Tumores	1						
Rotura	2	2	100,00				
Ramas >10 cm	3						
Deformaciones	1						
Tumores	1						
Otros signos	1						
Muerto/moribundo	1						
Ramas tam. variable	22					6	15,38

	N par	Inter.físicas		Compet/Espesura		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
Otros signos	6						
Rotura	2						
Muerto/moribundo	14					6	15,38
TRONCO/C.RAÍZ							
Tronco	46			8	100,00	16	41,03
Deformaciones	5						
Otras deformaciones	3						
Tumores	2						
Otros signos	2						
Heridas	13						
Grietas	3						
Otras heridas	10						
Resinosis	18					16	41,03
Inclinado	8			8	100,00		



FIG 6: Ramillo perforado en la base por *Tomicus destruens*. Brotes muertos y colgantes po *Sirococcus conigenus*. Bandedo por chupadores. Escamaciones blanquecinas de *Leucaspis pini*.



Los dos principales parámetros para evaluar el estado de salud en masas forestales son la **defoliación** y **decoloración**

DEFOLIACION: se entiende por defoliación la pérdida de hojas/acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable, es decir, eliminando del proceso de estima la copa muerta (ramas y ramillos claramente muertos) y la parte de la copa con ramas secas por poda natural o competencia.


De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de defoliación o daño:

- ✓ **Arboles sin daño:** defoliación 0-10%
- ✓ **Ligeramente dañados:** defoliación 15-25%
- ✓ **Moderadamente dañados:** defoliación 30-60%
- ✓ **Gravemente dañados:** defoliación 65-95%
- ✓ **Arboles muertos:** defoliación 100%

DECOLORACION: se entiende por decoloración, la aparición de coloraciones anormales en la totalidad del follaje o en una parte apreciable del mismo, utilizándose en su evaluación un criterio subjetivo que implica el conocimiento del medio forestal correspondiente por parte del evaluador.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de decoloración:

- ✓ **Clase 0:** decoloración nula
- ✓ **Clase 1:** decoloración ligera
- ✓ **Clase 2:** decoloración moderada
- ✓ **Clase 3:** decoloración grave



4. Instrumentación.

Para el seguimiento intensivo y continuo de la parcela están instalados los siguientes equipos de medición:

TABLA 8: Equipos de medición instalados en la parcela. Periodicidad quincenal 1997-2011; Mensual desde 2012

Variable	Equipo	Parcela Interior	Parcela Exterior	Instalación	Periodicidad
Meteorología	Torre meteorológica		1	2003	Quincenal/Mensual
	Placa solar		1		
	Meteodata		1		
	Anemómetro		1		
	Veleta		1		
	Piranómetro		1		
	Termómetro		1		
	Sonda Humedad		1		
	Pluviómetro		1		
Precipitación incidente	Acumuladores		4	2003	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro		1		
	Captador nieve		-		
Trascolación	Acumuladores	6		2003	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro	1			
	Captador nieve	-			
Desfronde	Captadores desfronde	4		2006	Quincenal/Mensual
Inmisión	Dosímetros pasivos		12	2006	Quincenal/Mensual
Crecimiento	Dialdendro en continuo	15		2010	Quincenal/Mensual
Fenología	Árboles de seguimiento	20		2005	Quincenal/Mensual



FIG 7: Parcela exterior. Torre meteorológica, acumuladores y caja de dosímetros. Parcela interior.

5. Deposición atmosférica.

La **deposición atmosférica** es un conjunto de procesos que conducen al depósito de materiales ajenos (a través de hidrometeoros, aerosoles o movimientos de gases) sobre la superficie descubierta del suelo o sobre la superficie exterior de árboles y plantas (troncos, ramas y hojas). La deposición depende de la concentración de contaminantes en una estación y momento determinados, lo que a su vez es función de la situación y actividad de las fuentes de emisión (grandes núcleos urbanos o industrias) así como de las condiciones atmosféricas, que determinan no sólo el movimiento de los contaminantes sino la reactividad entre los mismos.

La deposición atmosférica total consta de tres componentes:

- ✓ **Deposición seca:** depósito directo de los contaminantes sobre la superficie del suelo, el agua y la vegetación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas próximas a los focos de emisión.
- ✓ **Deposición húmeda:** depósito arrastrado hacia el ecosistema por la lluvia o la nieve. Previa unión de los contaminantes a las nubes o gotas de precipitación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas alejadas de los focos de emisión.
- ✓ **Deposición por nubes, niebla y oculta:** la vegetación intercepta directamente el agua y los contaminantes de las nubes, niebla, rocío y escarcha.

Para desarrollar un programa de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los bosques, uno de los objetivos principales del programa, es necesario disponer de una estimación de la cantidad de contaminantes que entran periódicamente por unidad de superficie. Como sistema de medición más económico y eficaz se ha desarrollado el **método de trascolación**, empleado en todo el sistema ICP-Forests, que permite la estimación de las deposiciones total y seca, el cálculo de la deposición húmeda y la caracterización de los procesos de interacción entre los contaminantes que tienen lugar dentro del arbolado.

Para caracterizar la deposición se toman como vías de entrada al ecosistema:

- ✓ **Precipitación en campo abierto:** denominada también precipitación incidente o *bulk deposition*, que llega al suelo directamente desde el cielo, sin atravesar el dosel arbóreo y que se corresponde con la deposición húmeda
- ✓ **Precipitación bajo dosel arbóreo:** denominada también trascolación o *throughfall* en la que se recoge el agua que llega al suelo tras atravesar el follaje de la masa forestal, tras mojar la superficie de las copas e interactuar con ellas, arrastrando parte de la deposición seca previamente caída, así como la precipitación húmeda.

La toma de muestras se hace en una batería de colectores normalizados situados a campo abierto y bajo cubierta arbórea y se analizan en una serie de laboratorios de referencia convenientemente intercalibrados entre sí, a través de un exhaustivo sistema de control y aseguramiento de calidad, de forma que resulten intercomparables y coherentes entre sí los resultados obtenidos en los países integrantes del programa. Para el cálculo de la deposición hay que tener en cuenta tanto la cantidad de precipitación al ecosistema como la concentración de los diferentes solutos en la misma.

Como variables de medición de la deposición, el manual considera los siguientes parámetros:

TABLA 9: parámetros descriptores de la deposición atmosférica en los ecosistemas forestales del Programa ICP-Forests.

Variable	Descripción	Valores de referencia RTSAP(*)
pH	Medida de la acidez o basicidad. Se considera lluvia ácida con valores $\leq 5,65$.	6,5 – 9,5
Conductividad	Índice de la presencia general de solutos en el agua.	$\leq 2.500 \mu\text{S/cm}$
Calcio	Elementos que se encuentran en el agua de lluvia debido fundamentalmente a su origen terrígeno, al formar parte de la mayoría de los suelos, especialmente en zonas de terreno calizo.	n.d
Magnesio		n.d
Potasio		n.d
Sodio	Elementos de origen marino, dependiendo su presencia de la distancia a la línea de costa. Papel tóxico en la vegetación	200 mg/l
Cloro		250 mg/l
Amonio	Procede de emisiones contaminantes a la atmósfera fundamentalmente de actividades agrícolas o ganaderas. Papel en la acidificación de los suelos.	0,50 mg/l
Nitratos	Producidos por la actividad industrial, doméstica y de transporte, ligados a procesos de combustión y responsables de la acidificación de la deposición que llega a los ecosistemas forestales. Papel precursor (N) en la formación de ozono, contaminante secundario en forma de aerosol.	50 mg/l
Sulfatos		250 mg/l

(*)RTSAP: Reglamento Técnico-Sanitario de Aguas Potables.

Se caracteriza a continuación la deposición atmosférica en la parcela 54Ph, pasando revista a la evolución de los distintos parámetros a lo largo de la series histórica estudiada, haciendo la salvedad de que se trata de años completos, a excepción de los años 2012 (enero-julio) y 2014 (abril-diciembre), por lo que caben ciertas anomalías. En esta parcela se empezaron a tomar datos a partir de 2003.

De cada parámetro se da el comportamiento del parámetro, la diferencia existente entre trascolación (bajo cubierta arbórea) y precipitación incidente (a campo abierto), lo que da idea tanto del papel del arbolado como sumidero como de la incidencia de la deposición seca, así como la distribución por trimestres de cada deposición, con objeto de caracterizar una posible tendencia temporal en el aporte de polutentes al ecosistema.

5.1. pH.

TABLA 10: Caracterización pH. Media anual ponderada por volumen (en rojo valores anuales < 5,65), porcentaje de muestreos en los que se ha obtenido pH < 5,65 (lluvia ácida), precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997							5,95	6,27
1998							5,84	6,21
1999							6,19	6,48
2000							6,07	6,27
2001							5,86	6,00
2002							6,41	6,54
2003	6,89	0,00	214	6,58	7,69	230	6,17	6,21
2004	6,68	0,00	460	6,80	0,00	507	6,19	6,13
2005	6,62	0,00	222	6,78	0,00	347	6,01	5,98
2006	6,63	0,00	240	6,39	0,00	446	6,13	6,07
2007	6,58	0,00	506	6,24	15,38	772	6,01	5,79
2008	6,58	0,00	412	6,50	8,33	593	6,14	5,99
2009	6,61	0,00	317	6,43	5,88	499	6,14	6,13
2010	6,89	0,00	311	6,81	0,00	467	6,22	6,19
2011	6,38	0,00	315	6,22	12,50	450	6,10	6,04
2012	6,20	0,00	58	6,15	0,00	98	5,96	5,98
2014	6,26	0,00	345	6,26	0,00	362	6,17	6,16
Media	6,57	0,00	309,15	6,47	4,53	433,68	6,09	6,14




FIG 8: Variación temporal de pH, porcentaje de lluvia ácida, precipitación e intercepción

5.2. Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$).

TABLA 11: Caracterización Conductividad. Media anual ponderada por volumen, precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997							25,59	22,11
1998							29,47	22,63
1999							33,24	19,93
2000							35,37	22,07
2001							28,43	16,06
2002							49,05	30,17
2003	226,21		214	42,50		230	46,47	25,27
2004	221,60		460	42,68		507	63,98	37,20
2005	253,10		222	38,98		347	65,86	30,61
2006	320,05		240	35,03		446	61,93	28,83
2007	170,99		506	47,45		772	50,03	28,98
2008	179,67		412	31,89		593	46,84	22,94
2009	194,90		317	33,96		499	49,56	20,18
2010	223,24		311	30,36		467	44,44	15,09
2011	265,38		315	36,81		450	51,52	19,09
2012	271,56		58	56,39		98	53,38	20,50
2014	45,90		345	14,85		362	28,66	15,29
Media	215,69		309,15	37,36		433,68	51,15	24,00




FIG 9: Variación temporal de la conductividad.

5.3. Potasio.

TABLA 12: Caracterización Potasio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								7,33	5,18
1998								19,45	13,28
1999								17,99	11,86
2000								22,33	15,28
2001								16,00	9,92
2002								19,36	7,73
2003			214	0,36	0,66	230	-0,66	12,93	3,83
2004	4,70	21,65	460	0,33	1,68	507	19,97	16,14	4,88
2005	7,58	16,82	222	0,65	2,27	347	14,55	12,47	5,15
2006	5,73	13,70	240	0,28	1,24	446	12,46	19,14	9,86
2007	4,96	25,11	506	0,43	3,33	772	21,77	20,44	7,92
2008	3,20	13,10	412	0,40	2,36	593	10,73	22,97	6,57
2009	6,44	20,29	317	0,31	1,56	499	18,73	18,05	4,28
2010	7,23	22,50	311	0,26	1,21	467	21,29	21,96	3,59
2011	5,76	18,15	315	0,43	1,93	450	16,21	18,92	5,75
2012	6,55	3,77	58	0,47	0,46	98	3,31	2,99	0,92
2014	1,66	5,73	345	0,13	0,48	362	5,25	12,25	1,58
Media	5,38	16,08	309,15	0,37	1,56	433,68	13,06	16,51	6,92




FIG 10: Variación temporal de deposición de K, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.4. Calcio.

TABLA 13: Caracterización Calcio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								7,29	5,16
1998								6,91	4,05
1999								10,77	6,68
2000								10,94	7,70
2001								8,58	6,22
2002								12,23	9,40
2003	9,07	19,41	214	1,61	3,71	230	15,70	23,45	26,64
2004	9,64	44,37	460	2,12	10,73	507	33,64	18,95	20,04
2005	11,68	25,93	222	2,52	8,75	347	17,17	11,17	9,81
2006	13,74	32,84	240	2,57	11,48	446	21,36	17,51	16,49
2007	10,27	51,94	506	2,33	17,99	772	33,95	18,16	14,99
2008	7,19	29,43	412	1,85	10,85	593	18,57	14,94	12,47
2009	7,72	24,33	317	1,36	6,77	499	17,56	10,43	6,81
2010	8,38	26,05	311	2,16	10,07	467	15,98	11,50	7,59
2011	12,04	37,93	315	2,25	10,11	450	27,83	11,32	6,29
2012	10,27	5,91	58	4,74	4,61	98	1,30	3,22	2,60
2014	3,49	12,03	345	1,39	5,02	362	7,01	8,87	6,09
Media	9,41	28,20	309,15	2,26	9,10	433,68	19,10	12,13	9,94




FIG 11: Variación temporal de deposición de Ca, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.5. Magnesio.

TABLA 14: Caracterización Magnesio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								3,66	3,20
1998								4,07	2,78
1999								4,18	2,58
2000								3,46	1,84
2001								2,99	1,45
2002								3,93	1,83
2003	4,16	8,89	214	0,93	2,14	230	6,76	3,97	1,65
2004	3,29	15,14	460	0,59	2,98	507	12,16	4,03	2,51
2005	4,06	9,01	222	0,67	2,32	347	6,69	2,73	1,01
2006	4,21	10,06	240	0,56	2,48	446	7,57	4,06	1,94
2007	3,06	15,48	506	0,64	4,92	772	10,56	4,56	2,17
2008	2,55	10,42	412	0,59	3,47	593	6,95	3,99	1,87
2009	2,82	8,88	317	0,44	2,18	499	6,70	3,95	1,67
2010	3,18	9,90	311	0,28	1,32	467	8,58	4,42	1,89
2011	4,73	14,91	315	0,52	2,35	450	12,56	3,98	1,27
2012	5,04	2,90	58	0,71	0,69	98	2,21	2,35	1,52
2014	0,85	2,94	345	0,12	0,44	362	2,50	1,96	0,77
Media	3,45	9,87	309,15	0,55	2,30	433,68	7,57	3,66	1,88





FIG 12: Variación temporal de deposición de Mg, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.6. Sodio.

TABLA 15: Caracterización Sodio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								6,07	6,65
1998								11,74	10,50
1999								19,31	13,85
2000								18,12	13,02
2001								18,38	12,14
2002								28,50	18,75
2003	32,65	69,88	214	4,17	9,60	230	60,28	22,49	12,86
2004	16,82	77,43	460	3,35	17,00	507	60,43	22,85	13,75
2005	24,23	53,79	222	3,03	10,50	347	43,30	14,42	7,16
2006	23,49	56,15	240	3,75	16,74	446	39,41	24,17	16,07
2007	18,40	93,09	506	4,86	37,54	772	55,55	23,14	14,21
2008	16,52	67,58	412	3,71	21,77	593	45,80	19,63	11,01
2009	14,18	44,68	317	2,78	13,86	499	30,81	22,09	12,27
2010	14,53	45,19	311	1,69	7,91	467	37,28	24,37	13,76
2011	25,34	79,83	315	3,22	14,47	450	65,36	20,72	5,97
2012	23,84	13,71	58	4,10	3,99	98	9,72	4,35	2,86
2014	0,93	3,21	345	0,39	1,40	362	1,81	7,06	4,77
Media	19,18	54,96	309,15	3,19	14,07	433,68	40,89	18,08	11,15



5.7. Amonio.

TABLA 16: Caracterización Amonio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								1,81	8,19
1998								2,24	8,36
1999								2,71	3,66
2000								2,48	4,26
2001								1,86	1,82
2002								2,43	2,91
2003	1,58	3,38	214	0,33	0,76	230	2,62	3,06	3,10
2004	1,16	5,36	460	0,28	1,43	507	3,93	4,12	3,23
2005	2,90	6,43	222	0,38	1,31	347	5,12	2,41	1,80
2006	2,77	6,66	240	0,34	1,52	446	5,14	3,62	3,05
2007	1,61	8,14	506	0,32	2,50	772	5,64	3,53	3,58
2008	2,29	9,45	412	0,56	3,31	593	6,14	2,91	2,62
2009	1,76	5,59	317	0,40	1,97	499	3,62	2,73	1,82
2010	3,07	9,55	311	0,33	1,54	467	8,00	3,12	2,09
2011	2,93	9,24	315	0,43	1,92	450	7,32	4,36	3,15
2012	2,87	1,65	58	0,57	0,55	98	1,10	2,26	2,06
2014	2,08	7,18	345	0,73	2,63	362	4,54	4,22	3,26
Media	2,28	6,60	309,15	0,42	1,77	433,68	4,83	2,93	3,47




FIG 14: Variación temporal de deposición de amonio, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.8. Cloro.

TABLA 17: Caracterización Cloro. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								10,88	10,93
1998								19,88	16,27
1999								36,56	23,56
2000								28,62	15,70
2001								32,37	19,20
2002								44,79	24,88
2003	30,72	65,74	214	6,18	14,23	230	51,51	39,97	31,89
2004	43,87	202,00	460	6,68	33,84	507	168,17	47,45	37,43
2005	40,17	89,17	222	4,95	17,18	347	71,99	28,61	21,76
2006	41,84	100,42	240	6,06	27,01	446	73,41	49,90	41,76
2007	30,73	155,49	506	9,29	71,75	772	83,75	45,78	37,79
2008	29,12	119,96	412	6,29	37,28	593	82,67	40,90	30,60
2009	26,35	83,53	317	5,81	28,98	499	54,55	45,08	25,80
2010	28,55	88,80	311	3,55	16,60	467	72,20	41,17	21,32
2011	37,99	119,68	315	5,61	25,24	450	94,43	29,44	13,12
2012	52,10	29,96	58	12,97	12,62	98	17,34	11,34	5,87
2014	0,34	1,16	345	0,16	0,59	362	0,57	6,22	3,12
Media	32,89	95,99	309,15	6,14	25,94	433,68	70,05	32,88	22,41




FIG 15: Variación temporal de deposición de Cl, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.9. Nitratos.

TABLA 18: Caracterización Nitratos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								2,24	2,13
1998								3,67	2,27
1999								4,43	2,94
2000								3,79	2,38
2001								3,51	2,09
2002								4,15	2,84
2003	6,24	13,35	214	0,52	1,19	230	12,17	5,39	2,74
2004	3,87	17,84	460	0,43	2,18	507	15,66	6,93	3,28
2005	5,61	12,46	222	0,89	3,07	347	9,38	4,31	1,83
2006	5,60	13,45	240	0,58	2,61	446	10,84	5,54	2,75
2007	2,52	12,77	506	0,48	3,69	772	9,08	5,06	2,96
2008	3,08	12,70	412	0,65	3,86	593	8,85	4,72	3,38
2009	3,45	10,93	317	0,42	2,08	499	8,85	3,87	1,87
2010	4,08	2,08	311	0,50	2,33	467	-0,25	1,87	2,37
2011	4,66	14,67	315	0,56	2,50	450	12,17	7,76	4,61
2012	3,74	2,15	58	0,52	0,50	98	1,65	1,65	0,99
2014	1,51	5,19	345	0,34	1,22	362	3,97	2,70	1,48
Media	4,03	10,69	309,15	0,53	2,29	433,68	8,40	4,21	2,52




FIG 16: Variación temporal de deposición de nitratos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.10. Sulfatos.

TABLA 19: Caracterización Sulfatos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997								3,00	3,70
1998								5,81	5,79
1999								7,17	6,35
2000								6,42	4,57
2001								5,68	4,11
2002								7,73	6,07
2003	4,21	9,00	214	1,31	3,02	230	5,98	6,85	4,80
2004	4,56	20,99	460	0,99	4,99	507	16,00	8,72	5,84
2005	5,67	12,58	222	1,29	4,47	347	8,11	4,69	3,12
2006	6,09	14,61	240	0,96	4,29	446	10,32	6,80	4,69
2007	3,87	19,56	506	1,06	8,15	772	11,41	7,24	5,12
2008	4,18	17,24	412	1,02	6,02	593	11,22	4,49	2,61
2009	3,86	12,24	317	0,87	4,36	499	7,88	4,67	3,32
2010	3,99	12,42	311	0,70	3,25	467	9,17	4,27	2,88
2011	4,56	14,36	315	0,90	4,03	450	10,33	5,93	4,57
2012	5,68	3,27	58	1,23	1,20	98	2,07	1,84	1,35
2014	0,41	1,40	345	0,36	1,29	362	0,11	2,25	2,07
Media	4,28	12,51	309,15	0,97	4,10	433,68	8,42	5,50	4,17




FIG 17: Variación temporal de deposición de sulfatos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.11. Interpretación de resultados.

En cuanto a la deposición atmosférica y por lo que se refiere a la parcela 54Ph, cabe destacar:

Se observan deposiciones notablemente más básicas que la media de la red, con valores de **pH** por encima de 6 y una ligera disminución en el último trienio, junto con práctica ausencia de fenómenos de lluvia ácida; correspondiendo valores más elevados al agua recogida a cielo abierto. El valor de la intercepción debida a la cubierta arbórea se sitúa en el 28,03%.

Por lo que se refiere a la **conductividad**, se advierten valores muy por encima de los valores medios de la red y mucho mayores en trascolación, lo que indicaría una mayor concentración en electrolitos posiblemente debida a la deposición en el follaje y ramas del arbolado del viento procedente del mar, que está a muy corta distancia de la línea de costa y tiene una notable incidencia en la deposición global.

En cuanto al **potasio, calcio y magnesio** elementos de origen terrígeno, presentan valores en trascolación superiores a la media y un comportamiento anual muy similar entre sí, coincidiendo en general máximos y mínimos, con episodios punta en 2004, 2007 y 2011 y reducciones en el último bienio en las que hay que matizar que no se han tomado años completos. En ambos casos los aportes bajo cubierta han resultado notablemente superiores a los habidos a campo abierto.

El **sodio y cloro**, elementos procedentes en gran parte del aporte de sal marina, y debido a la cercanía de la parcela al mar, presenta depósitos muy importantes y mucho mayores bajo cubierta arbórea; excediendo los valores medios de la red y con la mencionada incidencia en los altos niveles de conductividad encontrados.

El **amonio** presenta tasas considerablemente elevadas, muy superiores a la deposición media en la red, sobrepasándose los 8 kg/ha, mientras que los depósitos obtenidos a cielo abierto son netamente inferiores.

Las tasas de deposición de **nitratos** son, como en el caso anterior, bastante más elevadas bajo cubierta, sobrepasándose los valores correspondientes a la media de la red, mientras que los depósitos a cielo abierto son bastante menores. Han resultado particularmente marcados los depósitos correspondientes a 2004 y 2011.

Por último, y en referencia a los **sulfatos**, se advierte un comportamiento muy parecido al del caso anterior: depósitos comparativamente importantes en trascolación y muy superiores a los correspondientes a la precipitación incidente y máximos marcados en 2004, 2007 y 2008 en que se han superado los 15 kg/ha.

Por lo que se refiere a la distribución temporal de las deposiciones, se observa que en general los mayores aportes se producen a lo largo del otoño.

6. Calidad del aire. Inmisión.

Además del aporte de un determinado componente al ecosistema forestal, vía deposición seca/húmeda evaluada en el apartado anterior, en la Red Europea de Nivel II se mide desde 2000 la concentración en el aire de determinados contaminantes, lo que se conoce con el nombre de inmisión. Normativamente y en España se analiza la concentración de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amonio (expresados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y ozono (expresado en ppb).

La medición se hace a través de dosímetros pasivos, dispositivos de muestreo dotados de un compuesto químico diana sensible a los distintos contaminantes con los que va reaccionando y que permite evaluar la concentración en aire de los mismos. En el periodo 2000-2009 el cambio de dispositivos fue quincenal, efectuándose de forma mensual a partir de 2010.

Los principales resultados habidos en la parcela se especifican a continuación.

TABLA 20: Inmisión atmosférica. Concentraciones medias anuales de los distintos contaminantes en la parcela y media de la Red.

Año	Parcela				Media Red			
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NH ₃ (µg/m ³)	O ₃ (ppb)	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NH ₃ (µg/m ³)	O ₃ (ppb)
2000					2,45	2,91	2,49	34,34
2001					3,01	2,51	2,13	38,48
2002					0,95	0,75	1,57	32,70
2003	1,21	4,29	2,35	23,59	1,05	1,07	2,87	30,03
2004	1,76	4,56	3,46	19,10	1,47	1,34	2,69	25,36
2005								
2006	1,69	5,11	1,30	20,67	1,41	1,27	1,12	27,74
2007	1,81	4,82	1,33	19,72	1,49	1,45	1,44	27,36
2008	1,22	4,67	1,14	18,36	0,82	1,32	0,93	27,18
2009					1,06	2,89	1,30	36,30
2010	2,55	11,38	1,38	30,36	1,29	3,38	1,00	37,54
2011	3,13				1,50		0,48	
2012	3,76	10,46	1,26	25,94	1,60	3,25	0,85	38,79
2014	4,26	10,02	1,56	25,71	1,44	3,35	1,11	29,51
Media	2,38	6,91	1,72	22,93	1,50	2,13	1,54	32,11




FIG 18: Variación temporal de inmisión por dosímetros

Como puede verse en las gráficas anteriores, se advierte un considerable incremento en óxidos de nitrógeno y de azufre, que se sitúan muy por encima de los valores medios de la red y que han aumentado notablemente en los últimos años de evaluación.

7. Análisis foliar.

El objetivo del análisis foliar es, en concordancia con las especificaciones de las redes europeas, estimar el estado nutricional del arbolado y el impacto de los contaminantes atmosféricos en los ecosistemas forestales; así como la detección de tendencias temporales y sus patrones geográficos de distribución y con ello contribuir al conocimiento y cuantificación del estado de los bosques en Europa.

7.1. Análisis Macronutrientes.

Los macronutrientes analizados han registrado los siguientes valores:

TABLA 21: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 1000 acículas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
1995-1996	19 Ph	Tarragona	14,00	11,67	1,34	0,87	5,58	2,02	5,14	
	25 Ph	Alicante	10,00	9,28	1,10	0,96	3,44	1,91	5,85	
	41 Ph	Baleares	7,00	14,28	1,54	1,79	6,35	2,59	5,44	
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén	7,00	9,94	0,98	1,14	3,36	2,12	8,13	
	<i>P.halepensis</i>	España	9,50	11,29	1,24	1,19	4,68	2,16	6,14	
1997-1998	19 Ph	Tarragona								
	25 Ph	Alicante								
	41 Ph	Baleares								
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén								
	<i>P.halepensis</i>	España								
1999-2000	19 Ph	Tarragona	15,00	10,76	1,06	0,81	4,75	2,01	4,90	
	25 Ph	Alicante	14,00	11,39	1,54	0,82	8,11	2,42	3,14	
	41 Ph	Baleares	6,00	11,96	1,56	1,37	6,07	1,98	4,44	
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén	11,00	10,94	1,17	0,96	6,12	2,59	4,70	
	<i>P.halepensis</i>	España	11,50	11,26	1,33	0,99	6,26	2,25	4,30	
2001-2002	19 Ph	Tarragona	21,00	11,52	1,25	0,89	5,12	2,05	4,63	
	25 Ph	Alicante	18,00	10,94	1,43	0,98	4,77	1,94	4,17	
	41 Ph	Baleares	10,00	12,21	1,73	1,52	6,20	2,96	4,83	
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén	16,00	9,21	0,99	0,87	5,92	2,57	4,26	
	<i>P.halepensis</i>	España	16,25	10,97	1,35	1,07	5,50	2,38	4,47	
2003-2004	19 Ph	Tarragona	17,00	13,78	1,43	1,00	5,15	2,47	5,47	
	25 Ph	Alicante	16,00	11,19	1,61	0,91	7,74	2,41	3,42	
	41 Ph	Baleares	10,00	12,94	1,41	1,36	4,87	2,66	4,67	
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén	13,00	10,14	1,07	1,03	6,43	2,83	4,10	
	<i>P.halepensis</i>	España	14,00	12,01	1,38	1,08	6,05	2,59	4,42	
2005-2006	19 Ph	Tarragona	16,50	12,84	1,47	0,89	6,10	2,29	4,39	
	25 Ph	Alicante	13,00	11,01	1,39	0,97	4,84	1,80	4,31	
	41 Ph	Baleares	12,50	11,06	1,61	1,29	3,53	2,10	4,69	
	54 Ph	Valencia								
	208 Ph	Jaén								

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 1000 acículas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
	<i>P.halepensis</i>	España	14,00	11,64	1,49	1,05	4,82	2,06	4,46	
2007-2008	19 Ph	Tarragona	16,50	14,77	1,70	0,80	8,80	1,66	3,99	
	25 Ph	Alicante	15,00	11,20	1,48	0,69	5,63	1,57	3,54	
	41 Ph	Baleares	14,50	9,90	1,48	1,33	5,65	1,89	4,99	
	54 Ph	Valencia	17,50	13,70	2,17	0,88	5,11	1,73	3,79	
	208 Ph	Jaén	16,00	8,84	1,23	0,88	5,31	2,60	3,50	
	<i>P.halepensis</i>	España	15,90	11,68	1,61	0,91	6,10	1,89	3,96	
2009-2010	25 Ph	Alicante	14,00	10,51	1,77	0,84	9,70	2,22	3,39	
	54 Ph	Valencia	13,50	12,83	1,41	0,97	6,65	2,11	3,67	
	<i>P.halepensis</i>	España	13,80	11,44	1,63	0,89	8,48	2,17	3,50	
2011-2012	25 Ph	Alicante	15,05	10,42	1,57	0,82	7,81	2,00	3,57	
	54 Ph	Valencia	15,50	13,27	1,79	0,92	5,88	1,92	3,73	
	<i>P.halepensis</i>	España	15,23	11,56	1,66	0,86	7,04	1,97	3,63	
2013-2014	25 Ph	Alicante	13,22	9,25	1,35	0,67	7,75	1,95	2,89	52,98
	54 Ph	Valencia	12,55	10,05	1,08	0,71	6,20	2,15	3,13	54,86
	<i>P.halepensis</i>	España	12,95	9,57	1,24	0,69	7,13	2,03	2,99	53,73




FIG 19: Evolución de macronutrientes (mg/g eje izquierdo) y peso de acículas (g eje derecho) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas.

7.2. Análisis Micronutrientes.

TABLA 22: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	MICRONUTRIENTES (µg/g MS)				
			Na	Zn	Mn	Fe	Cu
2013-2014	25 Ph	Alicante		23,52	6,46	158,37	5,73
	54 Ph	Valencia		14,91	11,26	151,68	2,45
	<i>P.halepensis</i>	España		20,08	8,38	155,69	4,41




FIG 20: Evolución de micronutrientes (µg/g) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas

7.3. Interpretación de resultados.

Por lo que respecta a los análisis foliares efectuados en la parcela, cabe concluir:

En primer lugar hay que tener en cuenta que en la parcela 54Ph no se realizó el análisis foliar entre 1997 y 2006, por lo que sólo hay datos de parcela desde 2007-2008 hasta la última medición realizada en 2013-2014.

A la vista de los resultados obtenidos en los análisis de la muestra foliar de la parcela 54Ph podemos hacer las siguientes observaciones tanto de la parcela tratada individualmente como respecto a la media interanual del resto de parcelas con el pino carrasco como especie dominante:

El **peso** medido como media para la especie registró un fuerte ascenso hasta 2001-2002 pasando del mínimo (9,5 g/1000 acículas en la parcela) al máximo histórico (16,25 g/1000 acículas en la parcela) para la serie temporal, después los valores se han estabilizado tanto para la especie como para la parcela.

Respecto a los macronutrientes; se han obtenido valores bastante homogéneos para el **nitrógeno** en las acículas de la parcela si bien hay un descenso en su contenido en 2013-2014. El contenido de **azufre** presenta un ascenso paulatino en la media de la especie hasta 2007-2008 llegándose a alcanzar el valor máximo en ese año (2,17 mg/g) que baja drásticamente en 2013-2014. El **fósforo** muestra valores bastante estables para la parcela, aunque se registró un mínimo en 2003-2004, la media para el *Pinus halepensis* desciende a partir de 2007-2008 porque es la medición en que deja de medirse la parcela 208Ph la cual tenía valores muy elevados de fósforo. En cuanto al **calcio**, los valores medidos en la parcela siempre se han situado por debajo de la media para la especie, que aumenta mucho por los valores elevados registrados en la parcela 25Ph. El **magnesio** presenta pequeñas variaciones tanto en la media para la especie (1,97 – 2,59 mg/g MS) como para la parcela (1,73 – 2,15 mg/g MS). La presencia de **potasio** en la especie sigue una tendencia decreciente, más pronunciada entre 1995 y 2000, seguida de un periodo de estabilidad y nuevo decrecimiento a partir de 2009 momento en el que varias parcelas dejaron de medirse (19Ph, 41Ph y 208Ph). Por último, el análisis foliar de 2013-2014 ha sido el primero en el que se ha incluido la medición del contenido de **carbono** contando con una concentración de 54,86%, ligeramente superior a la media para la especie (53,73%).

Los micronutrientes sólo se han analizado en el muestreo de 2013-2014 y se han evaluado zinc, manganeso, hierro y cobre. Esta situación conlleva que no se pueda abordar la valoración de la evolución temporal de los nutrientes en acículas. Comparando con la parcela 25Ph, que también se midió en ese muestreo, todos los micronutrientes tienen menor presencia en acículas excepto el manganeso que en la 54Ph es más de un 42% superior que en la otra parcela.

8. Desfronde.

Con periodicidad mensual se ha recogido el desfronde o litterfall en la parcela mediante captadores normalizados que recogen la caída correspondiente a 1 m² de superficie. La muestra así tomada se divide en sus principales componentes (hojas, ramillas de diámetro inferior a 2 cm y otras, que incluyen frutos, líquenes, musgos,...) y se analiza en el laboratorio.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos desde 2006; haciéndose la salvedad al igual que en casos anteriores, de que en 2012 se ha muestreado el periodo enero-julio, mientras que en 2014 los análisis corresponden al periodo mayo-diciembre.

TABLA 23: Resultados medios del análisis de desfronde en sus distintas fracciones. Aporte anual en kg/ha; porcentaje de carbono y contenido en mg/g de materia seca de nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, magnesio y potasio.

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
2006	Hojas	3.465	53,43	9,75	1,36	0,61	8,88	1,86	2,70
	Ramillas	250	52,24	11,76	1,62	1,11	15,97	1,60	3,10
	Otras	2.207	50,79	10,05	1,17	2,06	12,95	1,12	2,44
2007	Hojas	3.730	56,12	9,94	1,37	0,63	6,60	4,34	2,19
	Ramillas	305	54,87	10,28	1,40	0,80	8,31	7,77	1,78

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
	Otras	1.710	54,00	10,26	1,18	1,36	10,54	5,33	2,37
2008	Hojas	3.320	54,03	9,77	1,23	0,59	7,93	1,60	2,15
	Ramillas	390	52,48	7,30	1,00	0,38	13,51	1,01	0,66
	Otras	1.650	52,52	9,88	0,98	0,86	13,72	1,15	3,46
2009	Hojas	4.340	54,77	9,20	1,38	0,62	8,58	1,76	2,39
	Ramillas	630	53,69	9,79	1,27	0,73	12,96	1,32	2,19
	Otras	2.210	52,50	9,70	1,25	0,97	14,39	1,11	2,43
2010	Hojas	3.350	54,67	10,33	1,37	0,67	10,01	1,95	2,49
	Ramillas	645	53,83	12,25	1,72	0,92	15,16	1,29	2,29
	Otras	3.230	53,14	9,68	1,05	0,99	11,47	1,02	2,53
2011	Hojas	3.035	54,24	9,77	1,34	0,63	7,30	3,60	2,22
	Ramillas	497	53,04	10,45	1,43	0,82	11,06	5,43	1,71
	Otras	1.256	52,24	9,80	1,11	1,22	10,41	4,09	2,35
2012	Hojas	2.397	54,40	10,00	1,41	0,66	8,33	2,41	2,49
	Ramillas	380	53,48	10,97	1,51	0,87	13,92	3,02	2,10
	Otras	1.599	52,89	9,10	1,06	0,97	9,32	2,00	2,81
2014	Hojas	2.257	56,34	11,77	1,25	0,44	7,45	1,73	2,15
	Ramillas	57							
	Otras	781							
Media	Hojas	3.237	54,75	10,06	1,34	0,61	8,14	2,41	2,35
	Ramillas	394	53,37	10,40	1,42	0,80	12,98	3,06	1,98
	Otras	1.830	52,58	9,78	1,11	1,20	11,83	2,26	2,63




FIG 21: Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica

Puede verse, con carácter general, cómo el desfronde foliar se sitúa en torno a los 3.000-4.000 kg/ha; la aportación de las ramillas es considerablemente menor, siempre teniendo en cuenta que hace referencia a las ramillas con diámetro inferior a 2 cm; y que los contenidos en carbono de estos aportes superan el 50% del desfronde total.

9. Fenología.

La fenología estudia la relación entre los fenómenos climáticos y las características morfológicas del desarrollo anual de los vegetales. Tras las observaciones de series anuales suficientemente representativas, puede obtenerse una valiosa información sobre la respuesta de la vegetación frente a variaciones climáticas, acrecentar el papel de las especies forestales como bioindicadoras y explicar el estado actual de la vegetación. El conocimiento de las fases fenológicas del arbolado es también una importante herramienta de gestión fitosanitaria de las masas forestales, pues el ciclo biológico y la capacidad de daño de buena parte de las plagas forestales van ligadas al desarrollo de una determinada fase, particularmente en el caso de los insectos defoliadores. Los cambios fenológicos en la vegetación juegan además un importante papel en la modelación del paisaje.

La evaluación fenológica se hace sobre 20 árboles de la parcela, seleccionando de entre aquellos de las clases dominante o codominante y preferentemente con buena visibilidad de copa; siempre desde una posición fija para evitar sesgos de observación; quincenalmente desde 2005 hasta 2010 y de forma mensual a partir de entonces.

La evaluación de las distintas fases fenológicas ha experimentado sucesivos cambios metodológicos a lo largo de la serie histórica de estudio, resultando de entre ellas, las más significativas y coherentes la aparición de hoja y la floración; siempre haciendo la salvedad de que se ha considerado que una fase comenzaba cuando lo hacía el 50% de la población muestra.

Se presentan a continuación y para las fases mencionadas, los valores históricos obtenidos en la parcela 54Ph, de entre ellos el comienzo y fin de fase; su duración o amplitud; el número de días transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de inicio de la fase, y –como esbozo de la influencia de la temperatura en el fenómeno- los días-grado transcurridos desde el 1 de enero (periodo de parada vegetativa) y el comienzo de la fase, obtenido de la estación meteorológica instalada en la parcela.

TABLA 24: Resultados de la evaluación fenológica. Comienzo, final y amplitud de la fase. Días desde el 1 de enero hasta el comienzo de fase. Temperatura acumulada (grados-día) hasta el inicio de fase.

Año	Aparición Hoja/Acícula \geq 50% Población					Floración \geq 50% Población				
	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)
1999										
2000										
2001										
2002										
2003										
2004										
2005	25/05/05	03/08/05	70	144	1169	10/03/05	06/04/05	27	68	483
2006	02/05/06	12/07/06	71	121	1524	14/03/06	19/04/06	36	72	739
2007	19/04/07	26/06/07	68	108	1387	08/03/07	22/03/07	14	66	843

Año	Aparición Hoja/Acícula \geq 50% Población					Floración \geq 50% Población				
	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)
2008	07/04/08	02/07/08	86	97	1269	05/03/08	25/03/08	20	64	781
2009	06/05/09	07/07/09	62	125	1725	03/03/09	31/03/09	28	61	822
2010	28/04/10	25/05/10	27	117	1392	23/03/10	28/04/10	36	81	864
2011	26/04/11	23/05/11	27	115	1444	28/03/11	12/04/11	15	86	976
2012										
2014	25/05/14	26/06/14	32	144	2153					
Media			55	121	1508			25	71	787




FIG 22: Fases fenológicas. Días desde 1 de enero hasta comienzo de fase.

Como puede verse en los gráficos anteriores, la floración precede en la mayoría de los casos a la aparición de las acículas de la nueva metida, y tiene lugar hacia el mes de marzo, mientras que la aparición de las acículas se produce en torno al mes de abril, con un retraso en el último año de evaluación.



FIG 23: Floración masculina y elongación de la metida

10. Cintas diamétricas.

Como se ha indicado anteriormente, las parcelas van dotadas de dendrómetros en continuo, 15 en 2010, de quienes se ha tomado la medida mensualmente.

Para cada una de las cintas instaladas y año de observación se ha obtenido el crecimiento medio, mediante diferencia entre los valores máximos y mínimos anuales –expresado en datos absolutos y en porcentaje sobre el diámetro mínimo- junto con la oscilación o diferencia entre el diámetro en enero y diciembre de cada año, en idénticos términos que el parámetro anterior; y que no tiene necesariamente que coincidir, debido a movimientos de expansión y contracción del tronco ligados al flujo o parón de la savia.

TABLA 25: Valor medio dendrómetros. Crecimiento medio: diferencia en cm y porcentaje entre el máximo y mínimo del año. Oscilación media: diferencia y porcentaje entre los valores de enero y diciembre (o comienzo/fin de año en años incompletos)

AÑO	Crecimiento medio (cm)	Crecimiento medio (%)	Oscilación media (cm)	Oscilación media (%)
2011	0,14	0,33	0,14	0,16
2014	0,08	0,17	0,08	0,07
Media	0,11	0,25	0,11	0,11