

EN

COMPOSITAE

*Taraxacum ptilotoides* Sahlin



Chicoias, meacamas

**Microespecie descrita en 1984 y conocida solamente de tres macizos aislados del Pirineo aragonés.**

**Datos generales**

- Altitud: 1.900-2.500 m
- Hábitat: Suelos removidos o pisoteados
- Fitosociología: *Nardion*, *Festucion eskiae*, *Festucion scopariae*
- Biotipo: Hemicriptófito escaposo
- Biología reproductiva: Monoica, alógama
- Floración: VI-X
- Fructificación: VII-IX
- Expresión sexual: Hermafrodita
- Polinización: Anemófila
- Dispersión: Anemocora vilosa
- Reproducción asexual: No

**Identificación**

Hojas 50-120 mm, glabras. 3-6 lóbulos laterales deltoideos, reflejos, con el borde convexo derecho, a veces con algún diente; lóbulo terminal no muy largo, sagitado. Pecíolo estrechamente alado. Escapo 50-100 mm, glabro. Involucro maduro de hasta 16 mm. Flores amarillas; lígulas externas con estrías violáceas. Aquenio oscuro, cuerpo de 3,7 mm, pico de 8 mm. Vilano blanco.

**Distribución**

Endemismo del Pirineo aragonés: macizos de Aísa, Cotiella y Turbón.

**Biología**

Florece en dilatado período, según las lluvias y las heladas, dando muchísimas flores y frutos por cada pie, siguiendo una estrategia pionera, oportunista, que puede estar sometida a fluctuaciones.

**Hábitat**

Suelos removidos y pisoteados entre cervunales con regaliz (*Nardus stricta* y *Trifolium alpinum*), en lugares relativamente innivados (con *Carduus carlinoides*, *Plantago alpina*, *Ranunculus amplexicaulis*), no lejos de los pastos crioturbados con *Festuca eskia*, *F. rubra*, etc.

**Demografía**

El conjunto de poblaciones apenas sumaban 1 km<sup>2</sup> de área de ocupación real.

P.R. Pulido

**Amenazas**

El distinto grado de pastoreo puede causar fluctuaciones en las poblaciones, en algunos de cuyos puntos la invasión del pasto denso puede igualmente reducirlas.

**Conservación**


Mientras haya lugares erosionados (soliflucción, nieve, crioturbación), las poblaciones se podrán mantener, en especial en lugares donde se concentra el pisoteo de los animales domésticos o silvestres y se acumulan sus excrementos.

Se halla incluido dentro de los LIC “Los Valles” y “Macizo de Cotiella” propuestos por el Gobierno de Aragón.

**Ficha Roja**

**Categoría UICN para España:**  
EN B2ab(iii)  
**Categoría UICN mundial:** Ídem  
**Figuras legales de protección:**  
No existen

| POBLACIÓN                 | INDIVIDUOS | PRESENCIA (UTM 1x1 km) | AMENAZAS                       |
|---------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| Collado Magdalena I (Hu)  | 141 (D)    | 1                      | Competencia vegetal natural    |
| Collado Magdalena II (Hu) | 331 (D)    | 1                      | Pastoreo                       |
| Blancas (Hu)              | 103 (D)    | 1                      | Competencia vegetal natural    |
| Sayerri (Hu)              | 147 (D)    | 1                      | Pastoreo, vías de comunicación |

**Corología**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| UTM 1x1 visitadas:          | 4 |
| UTM 1x1 confirmadas:        | 4 |
| Poblaciones confirmadas:    | 4 |
| Poblaciones nuevas:         | 3 |
| Poblaciones extintas:       | 0 |
| Poblaciones restituidas:    | 0 |
| Poblaciones no confirmadas: | 0 |
| Poblaciones no visitadas:   | 0 |
| Poblaciones descartadas:    | 0 |



Referencias: SAHLIN (1984).

Autores: L. VILLAR.

Agradecimientos: Ana Marinas y Patricia R. Pulido.