


CRUCIFERAE

Iberis carnosa subsp. *nafarroana* Moreno

Taxón recientemente descrito, aún no totalmente reconocido. Los ejemplares de la localidad clásica, y única cita, entran dentro del rango de variación de la subespecie típica.

L. Fernández. © CSIC

**Identificación**

Planta con rosetas foliosas estériles. Porte arqueado-ascendente. Tallo ramoso. Hojas inferiores y medias de oblongas a espatuladas, generalmente dentadas. Inflorescencia en corimbo. Flores con pétalos desiguales, blancos. Silícula escotada, dehiscente y con una semilla en cada cámara. La entidad de esta subespecie no ha sido reconocida en alguna obra reciente¹.

Distribución y hábitat

Esta subespecie fue descrita a partir de ejemplares encontrados en Ancín cerca de Estella (Navarra) y sólo se ha citado en esta localidad². La especie se distribuye por las montañas del Mediterráneo occidental.

Cunetas y taludes rocosos, así como claros muy pedregosos en carrascal, sobre sustrato calizo. Le acompañan *Quercus ilex* subsp. *ballota*, *Genista scorpius*, *Thymus vulgaris*, *Aphyllantes monspeliensis*, *Saponaria ocymoides*, *Cistus albidus*, *Crataegus monogyna* y *Carex halleriana*, entre otras.

Biología y demografía

Flores hermafroditas polinizadas por insectos, habiéndose observado abejas visitando las flores. La dispersión parece ser anemocora ya que los frutos tienen una pequeña ala. No se ha constatado ningún tipo de multiplicación vegetativa.

En el recuento directo, la única población no superó los 500 individuos en 3 km².

Amenazas y conservación

La única población que se ha citado de esta subespecie no parece muy amenazada, ya que se trata de una planta que se encuentra en taludes y cunetas. Sin embargo, alguna parcela de carrascal donde podía haber claros ocupados por ella ha sido roturada para su puesta en cultivo (viñedos).

No hay ninguna medida tomada para la conservación de este taxón.

Resulta prioritario determinar su estado taxonómico, ya que los ejemplares de la localidad típica entran dentro del rango de variación morfológica de la subespecie típica. El porte de las plantas allí encontradas es arqueado-ascendente, aunque hay variaciones por tratarse de medios donde circulan vehículos y en alguna ocasión pisan ejemplares. No se han encontrado ejemplares que, sin estar pisados, tengan forma difusa o procumbente.

Referencias: [1] AIZPURU *et al.* (1999); [2] MORENO (1993). **Autores:** D. GUZMÁN OTANO y D. GOÑI MARTÍNEZ.

Datos generales

Altitud: 450-600 m
Hábitat: Taludes y claros en carrascal, siempre en suelos rocosos
Biotipo: Caméfito
Floración: V-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocoria

Ficha Roja

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial: Idem
Figuras legales de protección:
 No existen

Corología

UTM 1x1 visitadas:	6
UTM 1x1 confirmadas:	3
Poblaciones confirmadas:	1
Poblaciones nuevas:	0
Poblaciones extintas:	0
Poblaciones restituidas:	0
Poblaciones no confirmadas:	0
Poblaciones no visitadas:	0
Poblaciones descartadas:	0