




Nombre común
Nombre científico
[AIG, ORD, PIC]

Rana bermeja
Rana temporaria



J. Ara Cajal/Fototeca CENEAM



De aspecto robusto, es la mayor de las ranas pardas ibéricas, **mide** unos 9 cm. **Cabeza** y hocico redondeados. Los **ojos** con pupila horizontal, y el iris tiene reflejos dorados. Presenta dos manchas oscuras a ambos lados de la cabeza en forma de antifaz. El tercer dedo de las manos es siempre mayor que el resto.


Piel lisa de coloración muy variable, encontrando ejemplares negros, naranjas o incluso rojos, con un diseño liso o jaspeados y manchados. Presenta unos pliegues en los laterales del dorso.

Es una rana **terrestre**, que se puede encontrar en una gran variedad de hábitats, desde prados de montaña hasta bosques de robles y hayas, donde pasa el día bajo la hojarasca o bajo tocones de árboles. En la época de reproducción, prefiere las charcas temporales, y no es raro encontrarlas en cunetas y rodadas en pistas forestales.

Las **hembras**, una vez realizada la puesta no suelen regresar más veces a las charcas, allí depositan una masa de entre 1.000 y 2.000 **huevos**, de color negro que nada más caer al agua se hunde pero, al poco tiempo, la gelatina que los rodea se hidrata y sube a la superficie tomando aspecto de globo que a veces alcanzan los 20 cm de diámetro. Las **larvas** tienen una coloración parda y ligeramente jaspeada con matices dorados y cobrizos.

La **actividad** suele ser mayor al oscurecer y durante la noche. Se alimentan por el día y por la noche. La **dieta** está compuesta sobre todo por artrópodos terrestres y también por lombrices. En presencia de un posible depredador, las ranas adultas pueden aplastarse contra el suelo y a veces se tapan la cabeza con las patas anteriores.

Rana bermeja



Fuentes: SIARE OAPN (2015)